

BIHANG TILL K. SVENSKA VET. AKAD. HANDLINGAR. Band. 5. № 4.

SYSTEMA ACRIDIODEORUM.

ESSAI D'UNE SYSTÉMATISATION DES ACRIDIODÉES.

PAR

C. STÅL.

I.

COMMUNIQUÉ LE 19 SEPTEMBRE 1877

STOCKHOLM, 1878.

P. A. NORSTEDT & SÖNER.
KONGL. BOKTRYCKARE.

J'ai basé le groupement des Acridides principalement sur des caractères tirés de la plus ou moins grande distance entre les lobes métasternaux, comme aussi de la présence ou de l'absence d'une épine apicale au bord externe des tibias postérieurs. J'ai cependant cru devoir dévier dans quelques cas de ces principes fondamentaux du système, mais j'ai toujours eu soin d'appeler l'attention sur ces cas exceptionnels, qui ne pourront jamais être évités dans un système ayant la prétention d'être appelé naturel, et encore moins du moment où ce système est présenté sous une forme synoptique. Il y aurait peut-être lieu de faire encore quelques exceptions, parmi lesquelles je signalerai seulement que le genre *Dicaearchus*, muni, au bord externe des tibias postérieurs, d'une épine apicale fort petite, dont la présence est très difficile à constater, devrait occuper, dans le système, une place plus rapprochée du genre *Agesander*, manquant de cette épine. Ce rapprochement pourrait au reste se motiver par la proche conformité qui existe dans la plupart des caractères de ces genres, et peut-être aussi dans la forme des parties anales du mâle, inconnu chez l'un des genres.

J'ai réparti les Acridides en treize divisions, dont la plupart me paraissent très naturelles. J'espère en même temps avoir réussi à trouver pour ces divisions des caractères généralement bons et faciles à saisir. J'ai toutefois été forcé dans quelques cas de réunir dans la même division des éléments sur l'affinité naturelle desquels j'ai certains doutes, en partie par suite du manque de matériaux suffisamment complets. Les plus importants de ces cas sont les suivants.

Le genre *Mazaea* paraît se rapprocher par plusieurs caractères des genres de la première division. Il présente, d'un autre côté, des différences si notables dans la forme de la tête et la position des ocelles, que l'on peut se demander si sa place dans la même division que *Tropidonotus* et d'autres genres voisins est vraiment conforme à la nature.

J'ai également des doutes sur l'affinité des trois genres compris dans la troisième division. Ils présentent toutefois certains caractères communs assez remarquables, et il m'est impossible de leur donner pour le moment une place plus convenable dans le système. Dans la sixième division, j'ai réuni des genres indubitablement rapprochés l'un de l'autre par la largeur insignifiante de la côte frontale à sa base, mais qui paraissent, d'un autre côté, présenter entre eux des différences assez sensibles. Il est possible que quand on en connaîtra un plus grand nombre d'espèces dans les deux sexes, il faudra dissoudre cette division et répartir les genres sur des points différents de la huitième. Le genre *Coryphistes* constitue une forme assez distincte. *Vilerna* et *Nuceria*, genres qui me paraissent assez voisins, semblent, il est vrai, se rapprocher de *Coryphistes* par la forme de la côte frontale; mais, d'un autre côté, dans la forme des cerci et la conformation du dernier segment dorsal, comme de la plaque suranale chez les mâles, ces mêmes genres, *Vilerna* du moins, présentent une conformité si évidente avec certains genres de la huitième division, comme *Nicarchus*, p. ex., que l'on devrait pouvoir soupçonner dans cette conformité une affinité plus intime entre les genres en question. Les genres *Goniaea*, *Stropis*, *Cratippus* et *Cirphula*, très voisins les uns des autres, pourront peut-être conserver leur place près de *Coryphistes*; mais, d'un autre côté, ils se rapprochent, — et c'est principalement le cas de diverses espèces de *Stropis*, — si intimement de quelques espèces australiennes du genre *Euprepocnemis*, qu'il sera difficile de trouver une différence générique, sinon, peut-être, dans le nombre supérieur d'épines aux tibias postérieurs de ce dernier genre. Il faudra faire la connaissance d'une plus grande quantité d'espèces australiennes d'*Euprepocnemis*, et cela dans les deux sexes, pour être en état de décider cette question. *Anthermus* ressemble évidemment à *Catantops* dans la plupart de ses caractères, mais la largeur insignifiante de la partie basale de la côte frontale m'a amené à placer, jusqu'à nouvel ordre, le premier de ces genres dans la sixième division, comme c'est aussi le cas d'*Aleuas*, conforme, toutefois, à bien des égards, avec *Pezotettix*, type d'une limitation des plus difficiles.

J'ai réuni dans la huitième division quantité de genres qui non-seulement paraissent avoir entre eux une grande affinité,

mais qui sont en partie excessivement difficiles à limiter, surtout à l'aide de caractères communs aux deux sexes; cela en dépit de la circonstance que, dans la plupart des cas, les genres ne sont pas difficiles à distinguer pour un connaisseur, par suite de caractères habituels impossibles à exprimer par des mots. Je n'ai pu trouver jusqu'ici des caractères sur lesquels je fusse à même de fonder, dès l'abord et à ma satisfaction, un groupement synoptique des genres en question. Je me suis donc vu forcé de scinder mon plan en deux groupes basés sur l'habitat, qu'il se trouve dans l'ancien monde ou dans le nouveau monde. Ces deux groupes me paraissent répondre assez bien aux exigences d'un système naturel, et je ne crois pas qu'il soit possible d'exiger qu'un système pareil soit toujours présenté et motivé sous une forme synoptique. Si les types et les genres de la huitième division sont en général très difficiles à caractériser, c'est particulièrement le cas de *Pezotettix*, et je ne crois pas avoir réussi à le faire. Il faut disposer de matériaux infiniment plus riches que je n'ai eu la faculté d'en examiner jusqu'ici, pour être à même de fixer les rapports entre *Pezotettix* d'un côté, *Osmilia*, *Dactylotum*, etc., de l'autre. On arrivera peut-être au résultat qu'un groupement de nature à satisfaire, devra se baser exclusivement sur certaines particularités des mâles. Toutefois, il ne faudra pas trop se hâter de donner une importance qu'elles ne méritent pas, à certaines particularités saillantes, faciles à constater à première vue, mais à tout prendre d'une faible valeur systématique.

S'il m'a été possible de rendre aussi complet qu'il se présente ici, cet essai de systématisation des Aceridiodées, c'est grâce à la libéralité bien connue avec laquelle M. C. Brunner von Wattenwyl a eu l'obligeance de mettre à ma disposition les riches matériaux de sa précieuse collection.

Fam. ACRIDIODEA BURM.

Subf. Acerididae STÅL.

Conspectus divisionum.

- 1 (4). Lobi sternales in utroque sexu distantes, metasternales quam in plurimis Acerididibus multo magis distantes; intervallum loborum metasternalium intervallo loborum meso-

sternalium subæquale vel latius, in feminis latius quam in maribus; tuberculum prosterni haud transversum; tibiæ posticæ superne in utroque margine spina apicali distinctissima armatae, calcari apicali intimo calcari adjacente typice nonnihil longiore; intervallum oculorum latum, parte ocelligera costæ frontalis saltem duplo latius; carinæ laterales frontis in formis, quarum costa frontalis percurrens est, a costa haud vel levissime divergentes; articulus ultimus palporum maxillarium laminæ instar hand ampliatus; sulci transversi tres posteriores pronoti in formis alatis in dorso continui; lobus posticus pronoti in alatis, etiam in brachypteris, lobo antico haud vel raro paullo brevior; tympana haud vel levissime immersa; areæ radialis et analis alarum anterius vel ante medium, saltem in intervallis quibusdam venarum longitudinalium, venis transversis, quam in reliquis Acrididibus numerosioribus, areolas transversas, plerumque fortiter transversas, formantibus instructæ¹⁾; intervallum venarum tertium areæ radialis alarum latiusculum; intervallum secundum areæ analis in plurimis¹⁾ per majorem vel minorem partem longitudinis magis minusve dilatum, intervallis reliquis latius, et venuis transversis rectis, parallelis, areolas transversas formantibus, instructum; intervallum primum areæ analis alarum anterius vel ultra medium plicam longitudinalem teretem, extrorsum cumbentem, venuis transversis sigmoides instructam, plerumque formans¹⁾; articulus secundus tarsorum posticorum brevis.

- 2 (3). Fastigium verticis horizontaliter vel in planum occipitis productum, totum vel anterius sensim angustatum, plerumque triangulare, marginibus lateralibus totis vel per majorem partem compressis a facie separatum; tempora haud discreta; costa frontalis per totam longitudinem vel saltem basin versus sensim distinete angustata, parte basali interdum fortiter compressa et laminata; ocellus costæ frontalis ab antennis plerumque distinete remotus; femora postica in margine dorsali plerumque serrata vel denticulata; spinæ interiores tibiarum posticarum plerumque longæ vel longissimæ, spinæ apicales spinis reliquis breviore; sinus geniculares femorum posticorum plerumque angusti, angustiores quam in Acrididibus plerisque reliquis; lamina subgenitalis marium cognitorum producta, conica, acuminata vel subacuminata, vel compresso-acuminata; tibiæ fasciis yittisve nigris destitutæ; tarsi unicolores. — *Divisio prima.*
- 3 (2). Fastigium verticis magis minusve declive, rarissime subhorizontaliter vel in planum occipitis productum, in quo easu lamina subgenitalis brevis, recurva, et pedes magis

¹⁾ Exceptionem præbent genera *Procolpia* et *Munatia*.

minusve nigro-picti; ocellus costæ frontalis fere in linea, inter partem anticam serobum autennarum ducenda, positus vel ab hac linea parum remotus; costa frontalis ante ocellum plerumque abbreviata vel minus distincta, basin versus rarissime distinctius angustata, pone antennas numquam laminæ instar compressa; margo dorsalis femorum posticorum plerumque integer vel inermis; spinæ interiores tibiarum posticarum spinis exterioribus haud multo longiores. — *Divisio secunda.*

- 4 (1). Lobi metasternales contigui vel minus fortiter distantes, raro apud feminas æque vel fere æque distantes ac lobi mesosternales; alæ venis transversis minus numerosis, areolas quadratas vel longiores quam longiores formantibus, plerumque instructa; intervallum nullum alarum fortius dilatatum, nec venis scalaribus instructum.

Obs.: Hæc genera lobis metasternalibus, apud feminas saltem, fortiter distantibus gaudent:

Diponthus, *Dericorys* et *Antandrus*, in quibus fastigium verticis fortiter declive et sulci lobi antici pronoti, posterior saltem, in dorso interrupti vel obliterati;

Monachidium, *Oncolopha* et *Antiphon*, in quibus tibiae posticæ in margine exteriore spina apicali destitutæ;

Trybliophorus et *Ommatolampis*, in quibus articulus ultimus palporum maxillarium laminæ iustar compressus et ampliatus.

- 5 (6). Sulci transversi lobi antici pronoti, saltem posterior, in dorso late interrupti vel obliterati, sulcus posterior, quem adest, fere usque a lateribus lobi sensim recurvus et versus sulcum illum continuum, a quo lobi pronoti separantur, oblique ductus; intervallum oculorum costa frontali latius; fastigium verticis magis minusve declive, breve; oculi mediocres; lobi mesosternales per totam longitudinem distantes; lobi metasternales feminarum quam lobi mesosternales vix vel haud multo minus distantes; tibiae posticæ superne in utroque margine spina apicali armatæ; artculus secundus tarsorum posticorum brevis. — *Divisio tertia.*

- 6 (5). Sulci transversi lobi antici pronoti plerumque continui, raro in dorso obliterati vel interrupti, in quo casu tibiae posticæ superne in margine exteriore spina apicali destitutæ.

- 7 (20). Tibiae posticæ in margine exteriore spina apicali destitutæ.

Obs.: Genera *Aristia* et *Abila*, in quibus tibiae posticæ superne in utroque margine spina apicali instructæ, in hac serie prope *Phaeopariam* posui, propter structurum insignem partium quarundam capitis, *Phaeoparie* peculiarem.

Obs.: Genera *Mesops* et *Cervidia*, licet in margine exteriore tibiarum posticarum spina apicali destituta, in serie 20 (7) posui, propter maximam eorum affinitatem cum *Ischnacrida* et aliis.

- 8 (9). Sulci transversi lobi antici pronoti in dorso vel saltem in lateribus dorsi, obliterati; lobus posticus pronoti usque a lateribus in cristam sensim elevatus vel sensim convexus, gibbosus; oculi, præsertem apud feminas, in vertice sat distantes, sat convesi; caput obtusum; fastigium verticis maxime declive, in costam frontalem sensim obtuse arcuatim continuatum, immarginatum, cum temporibus confusum; costa frontalis depressa, ante ocellum evanescens vel subevanescens, a basi ocellum versus sensim angustata; carinæ laterales frontis oblique; antennæ longæ, lineares; elytra margine exteriore sensim curvato, costa a vena radiali sensim divergente; alæ apicem versus latae vel latinusculae, area radiali apice obtusa, leviter vel levissime prominula; lobi sternales apud feminas fere æque distantes, metasternales apud mares parum distantes; femora postica gracilia, marginibus carinisque inermibus; tibiæ posticæ extus in parte saltem quarta basali inermes: cerci marium cognitorum teretes, sensim acuminati; lamina supraanalis marium triangularis; lamina subgenitalis marium modice producta, obtusiuscula. — *Divisio quarta.*
- 9 (8). Sulci lobi antici pronoti, saltem sulcus unus, continui, rarius in medio dorsi interrupti, rarissime obliterati, in quo casu lobus posticus pronoti depresso.
- 10 (11). Carinæ laterales frontis os versus sat fortiter divergentes, apice quam ad antennas duplo vel fere duplo magis distantes; costa frontalis angusta, inter antennas intervallo oculorum circiter dimidio angustior, per maximam partem longitudinis levissime elevata, percurrens vel prope apicem frontis evanescens, apicem versus haud ampliata, marginibus cariniformibus vel laevigatis instructa; frons punctata; fastigium directione varians. breve vel brevissimum; vexillum anterius pone fastigium impressione vel sulco transverso, utrumque recurvo, anterius et extus carina vel ruga, nunc continua nunc interrupta, terminato instructus, præterea carina subtili, nunc usque ad basin capitidis extensa, nunc brevissima et tantum prope sulcum illum distinguenda, prædictus; caput magnum vel majusculum, exsertum; ocellus costæ frontalis ab antennis distincte nonnihil remotus; lobus posticus pronoti lobo antico brevior; pronotum totum punctatum vel ruguloso-punctatum; elytra, quum completa sunt, ante medium dense irregulariterque reticulata, areolis campi postradialis et interulnaris præsertim numerosis; spina prosternalis gracilis, proportionaliter longa, subcylindrica vel sensim acuminata; lobi

mesosternales per totam longitudinem sat distantes; lobi metasternales apud mares levissime distantes, apud feminas quam lobi mesosternales haud multo minus distantes; margo dorsalis femorum posticorum serratus; cerci marium cognitorum longi vel longiusculi; tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem interdum defici-entem, spinis octo armatæ; margines dorsales tibiarum posticarum teretes, haud ampliati; tympana haud vel vix immersa. — *Divisio quinta.*

- 11 (10). Carinæ laterales et costa frontis plerumque ubique æque vel fere æque distantes, interdum distinctius divergentes. apice tamen quam in typo Phæopariae proportionaliter minus distantes; vertex autice sulco transverso, utrimque recurvo, anterius ruga limitato, destitutus.
- 12 (19). Margines dorsales tibiarum posticarum teretes vel tere-iusculi, haud laminati; cerci marium plerumque toti recti vel subrecti, rarissime prope basin subito recurvi.
- 13 (18). Spinæ marginis exterioris tibiarum posticarum numero variantes, raro tantum quinque vel sex, in quo casu in-terrallum spinarum intermediarum intervallis reliquis haud vel tantum paullo longius.
- 14 (15). Fastigium verticis horizontaliter vel subhorizontaliter promi-nulum, cum occipite in eodem vel fere eodem plano jacens, usque a basi vel saltem ante medium triangulare, apice raro obtusius rotundatum, ibidem numquam incisum; tem-pora et latera fastigii inter se angulum distinctum rectum vel subrectum formantia, vel margine compresso separata, illa perpendicularia vel frontem versus reclinato-declivia; costa frontalis per totam longitudinem vel saltem pone antenas basin versus sensim angustata, basi angusta vel angustissima, ibidem intervallo oculorum saltem dimidio angustior, parte costæ inter antenas sita parte basali saltem duplo latiore, marginibus lateralibus usque ad apicem frontis magis minusve distincte elevatis vel levigatis; carinæ laterales frontis et margines costæ paralleli vel subparalleli, illæ distinctæ et usque ad apicem conti-nuatae; lobi mesosternales magis minusve distantes; lobi metasternales apud mares contigui vel leviter distantes, apud feminas cognitas magis distantes; pronotum totum vel saltem in lobis lateralibus punctatum vel rugulosum; tibiæ posticæ in margine exteriore spinis typice haud ultra novem armatæ. — *Divisio sexta.*

Obs.: Species quædam, quæ quoad formam costæ frontalis et directionem fastigii ad formas hujus divisionis appropinquant, quarum autem tibiæ posticæ in margine exteriore spinis ultra novem armatæ, in genere *Eupre-pocnemi* quærendæ.

Obs.: In *Coryphiste* quoque quærenda est species, cui est fastigium sat fortiter declive.

- 15 (14). Fastigium verticis plerumque distinete vel fortiter declive, raro subhorizontaliter prominulum, in quo casu costa frontalis tota vel partim immarginata, vel ubique latitudine subæqualis, vel sulcus costæ apicem fastigii intersecans.
- 16 (17). Lobi mesosternales longiores quam latores, retrorsum sensim ampliati vel subampliati, margine interiore toto recto, angulo apicali interiore distincto, acutiusculo; intervallum loborum mesosternalium retrorsum sensim angustatum vel lateribus parallelis instructum, longius quam latius; lobi metasternales leviter vel levissime distantes; fastigium capitis breve, obtusum, leviter declive, in costam frontalem sensim arcuatim continuatum; tempora angusta, obliqua, a fastigio verticis obsolete discreta vel cum hoc confusa; costa frontalis latiuscula vel lata, basi haud vel levissime angustata, inter antennas intervallo oculorum latitudine æqualis vel subæqualis; carinæ laterales frontis distinctæ, usque ad apicem continuatæ; pronotum carina dorsali instructum vel in lobo antico tectiforme, lobis ambobus longitudine æqualibus vel subæqualibus; elytra et alæ in speciebus omnibus hue usque cognitis completa, illa in area postradiali dense et confuse pluriseriatim reticulata; oculi in vertice modice distantes; typus, præsertim propter formam loborum mesosternalium eorumque intervalli facile recognoscendus; species magnæ vel majusculæ.
— *Divisio septima.*
- 17 (16). Lobi mesosternales transversi vel fere æque longi ac lati, angulo apicali interiore recto vel obtuso, plerumque rotundato, sæpe obtuse rotundato; lobus posticus pronoti lobo antico plerumque brevior; elytra et alæ sæpe abbreviata, rudimentaria vel nulla; species plerumque mediocres vel parvae. — *Divisio octava.*
- 18 (13). Spinae marginis exterioris tibiarum posticarum quinque vel sex, intervallum spinarum duarum mediarum inter Fallo spinarum reliquarum circiter duplo longius; tibiae posticæ femoribus breviores; caput fortiter exsertum; frons fortiter obliqua; pronotum basi rotundatum; femora postica in margine dorsali inermia; tuberculum prosternale apice transversim ampliatum; angulus posticus loborum lateralium pronoti rectus vel acutus, apice tamen rotundatus; abdomen apicem femorum posticorum superans; cerci marium recti, inermes, graciles; corpus gracile. — *Divisio nona.*
- 19 (12). Margines dorsales tibiarum posticarum apicem versus vel pone medium acuti, laminati, ciliati; cerci marium cogni-

torum basi lati, pone basin subito graciliores, superne sinuati et subito recurvi; femora postica in marginibus et carinis inermia et laevigata, lobis genicularibus acuminatis; elytra et alae in mihi cognitis numquam deficiens, raro abbreviata, plerumque longa et angusta; intervallum oculorum angustum vel angustissimum, parte interantennali costae frontalis haud latius, plerumque angustius; vertex anterius inter oculos plerumque nonnihil declive; fastigium verticis horizontale vel leviter et quam pars antica verticis minus declive, a vertice interdum impressione transversa separatum; lobi mesosternales et metasternales in utroque sexu plerumque contigui; pronotum dorso teres, carina longitudinali raro instructum, sulcis transversis tribus continuis praeditum, saltem in dorso per totam longitudinem punctatum, lobo postico abbreviato, posterius obtuso. — *Divisio decima.*

- 20 (7). Tibiae posticae quoque in margine exteriore spina apicali armatae, spina plerumque distinctissima, rarissime minutissima, obsoleta et ægre perspicienda, in una tibia interdum fortuito deficiente; lobi geniculares femorum posticorum plerumque sensim acuminati vel apice angulum formantes, interdum in lobum longum producti.

Obs.: Genera quædam, *Lentula*, *Cervidia*, *Mesops*, quorum tibiae posticae in margine exteriore spina apicali destitutæ, in hac serie quærenda.

Obs.: Spina illa apicalis tibiarum posticarum minutissima et ægerime perspicienda in *Dicearcho*, *Tanchira*, *Racilia* et *Tylotropidio*, in *Racilia* interdum deficiens.

- 21 (24). Lobi mesosternales magis minusve distantes; costa frontalis basi haud vel leviter angustata, raro basi ipsa subito fortiter compressa, hinc numquam per totam longitudinem vel per majorem partem longitudinis sensim ampliata; antennæ lineares, rarissime angustissime subensiformes.

- 22 (23). Costa frontalis ad sulculos transversos disci frontis subito evanescens, rarius ad vel fere ad apicem frontis continuata, in quo casu pars basalis costæ antrorsum distincte angustata vel anteunas versus oblique declivis; articulus secundus tarsorum posticorum plerumque elongatus; antennæ plerumque longæ; dorsum pronoti teres, carina nulla nisi obsoletissima instructum. — *Divisio undecima.*

Obs.: Genus *Hysia*, in quo costa frontalis ante sulculos transversos discoidales frontis nonnihil continuata est, propter articulum secundum tarsorum posticorum longum in hac divisione quærendum.

- 23 (22). Costa frontalis percurrens vel lounge versus apicem frontis continuata; pars basalis costæ sulculos discoidales frontis

versus hand vel obsoletissime angustata; articulus secundus tarsorum posticorum brevis. — *Divisio duodecima.*

- 24 (21). Lobi mesosternales per maximam partem longitudinis sutura longa et recta contigui, rasissime leviter distantes; basis vel pars basalis longitudine varians costæ frontalis angusta, plerumque laminæ instar fortiter compressa, costa per majorem vel minorem partem longitudinis ante illam partem angustam sensim ampliata; antennæ plerumque ensiformes. — *Divisio decima tertia.*

DIVISIO PRIMA.

- 1 (2). ♀. Ocelli ad marginem fastigii capitis positi; ocellus costæ frontalis ab antennis sat remotus; caput superne carina percurrente instructum; fastigium triangulare, marginibus lateralibus totis vel fere totis compressiusculis; frontis carinæ laterales ab antennis usque ad apicem extensæ, sensim divergentes, rectæ, subtuberculatæ, apice elevatores; costa frontalis apicem versus abbreviata, maxima parte humilis, marginibus lateralibus carinato-elevatis instructa, inter et præsertim pone antennas versus basin sensim sat fortiter elevata, basi fortiter compressa, carinis lateralibus costæ inter antennas abbreviatis, parte compressa basali inter antennas carinæ instar breviter continua; antennæ —? pronoti dorsum transversim leviter convexum, basi apiceque truncatum, postice haud productum, carina subtili longitudinali, sulcis transversis subtilibus intersecta, instructum, antrorsum sensim angustum, cum lobis lateralibus angulum distinctum, obtuse subcarinatum, formans; prosternum leviter elevatum et tuberculo conico, subacuminato, armatum; femora postica validiuseula, supra subtusque granulata, carina dorsali granulato-serrata, sinibus genicularibus subrectangulis; spinæ utrinque lateris tibiarum posticarum longitudine subæquales; tarsi breviuseuli; arolia parviuseula; corpus apterum. — (Gen. 1.) 1. *Mazæa* STÅL, 1876.
- 2 (1). ♂♀. Ocelli a margine fastigii capitis remoti; corpus plerumque alatum, raro brachypterum, rarissime apterum.
- 3 (4). ♂♀. Antennæ articulis circiter novem compositæ, depresso-ceilæ, anguste subensiformes; fastigium capitis sat productum, marginibus lateralibus usque a basi compressis; carinæ laterales frontis obsoletæ; costa frontalis percurrentis, per totam longitudinem carinato-marginata, maxima parte angustissima carinisque marginalibus hic illic contiguis

vel confusis instructa, parte circiter tertia apicali sensim ampliata; thorax et abdomen tectiformiter compressa; pronotum postice haud productum, basi apiceque truncatum, lobo postico brevissimo, acute tectiformi, lobo antico dorso anguste deplanato, sulcis transversis destituto, parte deplanata antrorum sensim latiore, utrimque carina in marginali terminata; tympanum nullum; prosternum leviter elevatum et spina conica gracilis eula instructum; lobi metasternales quam in generibus reliquis Tropidonoto affinis minus distantes, usque a foveolis divergentes; femora postica mediocria, margine dorsali remote serrato; spinæ interiores tibiarum posticarum spinis exterioribus haud multo longiores; lamina subgenitalis maris compressoproducta, haud longa; corpus apterum. — (Gen. 2.) 2.
Tropidostethus PHIL.

- 4 (3) ♂♀. Antennæ articulis numerosioribus, circiter viginti vel viginti duobus, compositæ; pronotum dorso posterius fortiter productum, lobo postico lobo antico haud breviore, sulcis transversis in dorso haud interruptis; lamina subgenitalis marium cognitorum conica, magis minus acuminata, sat longe producta; corpus alatum; elytra, saltem ante medium, plerumque dense vel densissime reticulata.
- 5 (12). ♂♀. Pronotum per totam longitudinem in cristam altam, compressam vel acute tectiformem, interdum sublaminatam elevatum, dorso anterius in angulum distinctissimum prominulum, posterius acutangulariter productum, lobo postico in macropteris lobo antico longiore; dorsum pronoti fere usque a sinn humerali antrorum sensim angustatum, cum lobis lateralibus angulum distinctum, carinatum vel serie tuberculorum parvorum præditum, formans; vena axillaris, quum elytra completa sunt, distinctissima, prope medium elytra cum vena anali confluens; interstitium scalare arearum radialis et analis alarum ampliatum et dense transversim venosum. — (Gen. 3—6.)
- 6 (11). ♂♀. Costa frontalis per totam vel fere totam longitudinem sensim angustata vel subangustata, haud nisi basi ipsa fortius compressa, in medio quam apicem versus haud multo angustior; fastigium capitis triangulare, subæquilaterum vel transversum; angulus, quem format margo anticus dorsi pronoti, obtusus, raro rectus vel acutiusculus; margo summus crista pronoti sensim vel subsensim arcuatus; lobi geniculares femorum posticorum angusti vel angustiusculi; elytra et area radialis alarum in macropteris apice angustiuscula, oblique truncata.
- 7 (8). ♂♀. Frons fortius obliqua; margines costæ frontalis toti distincte elevati; crista summa pronoti per totam longitudinem crenulata vel subserrata; lobi laterales pronoti margine exteriore recto vel sensim subrotundato,

angulo postico distinctissimo, recto, apice haud rotundato; margo costalis elytrorum pone ampliationen subbasalem haud sinuatus; femora postica angusta, in carinis dentata, lobis geniculairibus aeuminatis, angulis geniculairibus in dentem acutum productis; spinæ interiores tibiarum posticarum sat longæ. — 3. *Prionolopha* STÅL, 1873.

- 8 (7). ♂♀. Frons minus fortiter obliqua; margines eostæ frontalis haud vel leviter, nec umquam per totam longitudinem elevati; crista pronoti integra tota vel tantum posterius leviter erenuata; lobi laterales pronoti angulo postico obtuso vel obtusiusculo, rotundato; femora postica modice lata, basin versus latiora quam in genere præecedente; spinæ interiores tibiarum posticarum spinis exterioribus haud multo longiores.
- 9 (10). ♂♀. Fastigium verticis haud vel leviter transversum; crista pronoti posterius magis minusve distincte erenuata vel erosula; lobi laterales pronoti margine exteriore angulum obtusum rotundatum formantes, margine postico vix vel leviter obliquo; elytra et alæ completa, illorum margine costali pone ampliationem subbasalem leviter sinuato; carina dorsalis femorum posticorum saltem anterius serrata; lobi geniculares femorum posticorum aeuminati. — 4. *Tropidonotus* SERV., STÅL.
- 10 (9). ♂♀. Fastigium verticis latum, fortius transversum; oculi fortiter distantes; crista summa pronoti nullibi erenuata vel erosula; lobi laterales pronoti margine exteriore in medio leviter curvato, margine postico fortiter obliquo, angulo postico igitur obtusissimo; elytra et alæ fortiter abbreviata, illa subtriangularia, retrorsum sensim ampliata, postice oblique truneata, coriacea, punctata, venis duabus longitudinalibus elevatis instructa; carina dorsalis femorum posticorum integra, inermis; lobi geniculares femorum posticorum apice rotundata. — 5. *Alcamenes* STÅL, N. G.
- 11 (6). ♂♀. Costa frontalis inter ocellum et basin angusta vel angustissima, basin versus compressa et fortius elevata, ante ocellum sensim ampliata, carinis distinctis usque ad apicem continuatis marginata, his earinis apice quam ad ocellum saltem quadruplo magis distantibus; fastigium verticis longius quam latius, a basi ultra medium leviter, apice fortius angustatum; angulus, quem format margo anticus pronoti, acutus, sat longe productus; margo summus cristæ pronoti ab apice longe ultra medium reetus, dein in parte posteriore lobi postici angulum formans, vel totus fere reetus; elytra et area radialis alarum apice distincte et late truncata vel subsinuato-truncata; femora postica basin versus latiuscula, margine dorsali serrato, lobis geniculairibus latiusculis, apice rotundatis; spinæ interiores tibiarum posticarum sat longæ. — 6. *Colpolopha* STÅL, 1873.

- 12 (5). ♂♀. Pronotum crista alta, acute tectiformi vel compressa, destitutum, margine antico truncato vel in angulum obtusum, interdum apice emarginatum, prominulo; lobus posticus pronoti lobo antico longitudine æqualis vel subæqualis, posterius angulum rectum vel subacutum formans; vena axillaris elytrorum obsoleta vel obsoletiuscula, libera. — (Gen. 7—11.)
- 13 (18). ♂♀. Costa frontalis pone antennas fortiter compressa, ibidem sulco destituta, ante antennas per majorem vel minorem partem longitudinis sulcata vel marginibus elevatis instructa; interstitium scalare areæ analis alarum haud vel levissime ampliatum; pronotum medio carinatum vel obtuse suberistatum.
- 14 (17). ♂♀. Fastigium verticis longum, circiter duplo longius quam basi latius; costa frontalis inter et pone antennas fortiter elevata et laminæ instar compressa, ibidem sulco destituta, dein inter antennas et ocellum latior et leviter marginata, ante ocellum oblitterata; carinæ laterales frontis nullæ vel tantum apice distinguendæ; antennæ longæ, ensiformes, articulo primo longiore quam latiore; elytra apicem versus sensim fortiter angustata; femora postica in carina dorsali distincte serrata vel denticulata, lobis genicularibus latis; spinæ interiores tibiarum posticarum longæ.
- 15 (16). ♂♀. Elytra et area radialis alarum apice trnncata; carina dorsalis femorum posticorum postice sat fortiter elevata et apice in dentem majusculum prominula; femora postica breviuscula. — 7. *Procolpia* STÅL, 1873.
- 16 (15). ♂. Elytra et area radialis alarum longe producta, apicem versus fortiter angustata, apice anguste rotundata; carina dorsalis femorum posticorum posterius haud fortius elevata, apice in denticulum prominula; femora postica longiuscula. — 8. *Munatia* STÅL, 1875.
- 17 (14). ♀. Fastigium verticis triangulare, vix longius quam latius; costa frontalis percurrens, per maximam partem longitudinis sulcata et marginibus elevatis instructa, pone antennas subito compressa, ibidem sulco destituta; carinæ laterales frontis distinctæ totæ, ab ocellis usque ad apicem continuatæ; antennæ medioeres, sublineares; pronotum carina longitudinali instructum; elytra apicem versus leviter angustata, apice obtuse rotundata; area radialis alarum apice rotundata; carina dorsalis femorum posticorum inermis, subintegra; lobi geniculares femorum posticorum leviter producti, haud lati, sensim angustati; spinæ interiores tibiarum posticarum spinis exterioribus haud multo longiores. — 9. *Catreus* STÅL, N. G. (*Tropinotus ornaticollis* BLANCH. et *sulcaticollis* BLANCH.)
- 18 (13). ♂♀. Interstitium scalare areæ analis alarum ampliatum; carinæ laterales frontis inter scrobes antennarum et apicem

extensæ, totæ distinctæ; spinae interiores tibiarum posticarum fortiter elongatae.

- 19 (20). ♂♀. Costa frontalis haud nisi interdum basi ipsa compressa et sulco destituta, sulco plerumque usque ad vel fere ad basin continuato; pronoti dorsum carina longitudinali, interdum obtuse subcristata, instructum vel obtuse tectiforme; lobus posticus pronoti lateribus parallelis instructus vel antrorum sensim leviter ampliatus, cum lobis lateralibus angulum, magis minusve torosum, formans; margines illi lobi postici pronoti, elevationis obtusissimæ et magis minusve tuberculatae instar, per latera lobi antici oblique antrorum continuati; elytra alæque feminarum magis minusve abbreviata, illa prope basin latissima, hinc sensim fortiter angustata, apice angustissima. — 10. *Elæochlora* STÅL, 1873.
- 20 (19). ♂. Costa frontalis pone antennas laminæ instar fortiter compressa et ibidem sulco destituta; pronotum dorso planum, carina longitudinali nulla vel tantum posterius distinguenda instructum, antrorum per totam longitudinem sensim leviter angustatum; interstitium scalare areæ analis alarum maxime et per fere totam longitudinem areæ ampliatum. — 11. *Alophonota* STÅL, 1873.

DIVISIO SECUNDA.

- 1 (10). ♂♀. Carina vel crista lobi antici pronoti, quum adest, in summo margine sulcis transversis leviter intersecta, crista vel carina lobi postici haud altior; lamina supraanalis marium omnium mihi cognitorum et feminarum plurimarum tota vel lateribus nigra; femora postica in area media lateris exterioris maculis albicantibus destituta. — (Gen. 1—5.)
- 2 (5). ♂♀. Elytra latiuseula, tota minus dense irregulariter reticulata, inter ramos radiales et ulnares vena intercalata nulla vel irregulariter flexuosa et cum reti confusa, instructa; pronotum per totam longitudinem distinete cristatum vel carinatum; pedes nigri vel nigro-vittati; lamina supraanalis marium usque a basi sensim triangulariter angustata; lamina subgenitalis brevis, pone laminam supraanalem vix vel leviter prominula. — (Gen. 1—2.)
- 3 (4). ♂♀. Fastigium verticis subhorizontale, cum parte reliqua verticali capitidis fere in eodem plano jacens, a latere visum cum costa frontali angulum rectum formans; costa frontalis pone antennas basin versus sensim angustata, basi

ipsa compressa, ibidem sulco destituta; pronotum dorso obtuse carinatum, margine antico angulum obtusissimum rotundatum formante. — 1. *Dictyophorus* THUNB.

- 4 (3). ♂♀. Fastigium verticis fortiter declive, cum costa frontali a latere visa angulum obtusum, subrotundatum, formans; costa frontalis basi haud vel levissime angustata, inter ocellum et basin distinete sulcata; pronotum dorso cristatum vel altius carinatum vel tectiforme, margine antico angulum distinctum formante. — 2. *Tæniopoda* STÅL, 1873.
- 5 (2). ♂♀. Elytra minus lata, pone medium inter ramos radiales et ulnares seriebus duabus regularibus areolarum subrectangularium, vena intercalata distincta et recta separatis, instructa¹⁾; pronotum carina leviter elevata, haud cristata, in lobo antico interdum deficiente, instructum, margine antico truncato vel obtusissime rotundato, in medio plurimque leviter sinuato; fastigium verticis magis minusve declive.
- 6 (7). ♂♀. Pronotum sulcis transversis sat fortiter impressis instructum, lobo antico laevigato, nitido, dorso tereti, carina destituto, postice impressionibus duabus parvis instructo, lobo postico lobo antico nonnihil longiore, retrorsum subadscendente, depresso, carina instructo; costa frontalis ante ocellum subito evanescens, pone ocellum sulcata; lamina supraanalis triangulariter angustata; lamina subgenitalis brevis. — (Gen. 3.) 3. *Rhomalea* BURM.
- 7 (6). ♂♀. Pronotum sulcis transversis distinctis, quam in genere præcedente tamen minus fortiter impressis, instructum. carina, in lobo antico interdum obsoletiore vel fere oblitterata, præditum, lobis ambobus, saltem in dorso, punctatis vel rugosis, lobo postico lobo antico haud longiore; lamina supraanalis marium a basi fere ad vel ultra medium lateribus subparallelis instructa, posterius fortiter angustata; lamina subgenitalis producta; segmentum dorsale ultimum abdominis apice in medio bilobum. — (Gen. 4—5.)
- 8 (9). ♂♀. Frons parce rugosa, costa pone antennas obtuse subsulcata, ante ocellum angustata, obtuse sulcata et marginibus leviter elevatis instructa, fere ad apicem continuata; vena alarum, quæ interstitium scalare intus limitat, haud incrassata; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium apice in medio lobis duobus parvis obtusis instructus, inter lobos angulariter sinuatus; lamina supraanalis marium anterius vel ante medium lateribus parallelis instructa, posterius subito fortiter angustata, sulco obtuso longitudinali, ejus margines leviter elevati sunt, instructa. — 4. *Zoniopoda* STÅL, 1873.

¹⁾ Specimen unicum mihi cognitum *Anaua* elytris destitutum.

- 9 (8). ♂. Frons dense fortiterque punctata, costa ante ocellum subito evanescente; vena illa alarum, quæ interstitium scalare, quam in genere praecedente distinctius ampliatum, intus limitat, in medio alarum distinctissime incrassata; pars media sat lata marginis apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in processum longissimum, lamina supra-anali longiorem, sensim acuminatum, profundissime fissum, producta; lamina supraanalis marium anterius lateribus subparallelis instructa, dein apicem versus sensim levissime angustata, apice subito obtuse rotundata, in medio acute biuncisa, inter incisuras lobum brevem emittens, sulco longitudinali instructa, pone medium utrimque carina brevi obliqua prædita. — 5. *Anaua* STÅL, N. G.
- 10 (1). ♂♀. Lobus anticus pronoti in cristam altam, sulcis transversis profunde intersectam, inter sulcos magis minusve distincte lobatam, elevatus; lamina supraanalis marium carinis duabus, pone medium evanescens vel divergentibus, instructa, nec nigra, nec nigro-pieta; lamina subgenitalis marium longa, porrecta; pars dimidia lateralis marginis apicalis segmenti dorsalis ultimi marium fere in medio, ad cercos, angulum magis minusve distinctum formans; femora postica in area media laterum maculis albicantibus, seriatim dispositis, ornata; caput obtusum; fastigium verticis fortiter declive, in costam frontalem sensim obtuse arcuatim continuatum; costa frontalis nonnihil ante ocellum subito evanescens vel ante ocellum obtusissima; series spinarum tibiarum posticarum longe versus basin tibiarum continuatae. — (Gen. 6—8.)
- 11 (14). ♂♀. Oculi minus fortiter distantes; costa frontalis angustiuscula, basin versus haud ampliata; vena axillaris libera; lobi metasternales fortius distantes; caput parte posteriore pronoti angustius.
- 12 (13). ♂♀. Elytra densissime irregulariterque reticulata, areolis illis reticulæ, quæ ad venas harumque ramos positæ sunt, areolis reliquis majoribus; venæ intercalatæ vel spuriae nullæ vel cum reti confusæ; lamina subgenitalis marium apice integra. — 6. *Titanacris* SCUDD., STÅL. (= *Lophacris* SCUDD.)
- 13 (12). ♂♀. Elytra minus dense reticulata, inter ramos radiales et ulnares areolis quadrangularibus duplii serie positis instructa, inter series areolarum vena intercalata distincta prædita; lamina subgenitalis apice magis minusve distincte emarginata. — 7. *Tropidacris* SCUDD.
- 14 (11). ♀. Oculi fortiter distantes; caput parti posteriori pronoti latitudine æquale; costa frontalis lata, pone ocellum basin versus sensim ampliata; fastigium verticis maxime declive, obtusissimum, in costam frontalem subito continuatum, anterius obtuse sulcatum, marginibus lateralibus haud elevatis;

pronotum parviuseculum, per totam longitudinem cristatum, crista multilobulata, lobo postico lobo antico multo longiore; elytra ante medium densiuscule reticulata, pone medium inter ramos radiales et ulnares areolis subrectangularibus, longioribus quam latioribus, duplice serie positis, instructa; pectus angustum; lobi metasternales quam mesosternales nonnihil minus distantes; corpus compressiusculum; pedes postici —? — 8. *Prionacris* STÅL, N. G.

DIVISIO TERTIA.

- 1 (2). ♀. Lobus anticus pronoti brevis, lobo postico fere di-midio brevior, antice subtruncatus, dorso teres, carina destitutus, sulcus transversus posticus late interruptus, versus sulcum, lobos separantem, ductus; lobus posticus pronoti carina subtili instructus, posterius angulum subrectum, apice rotundatum, formans; oculi fortiter distantes; fastigium verticis fortiter declive, in costam frontalem sensim arcuatim continuatum; costa frontalis lata, obtusa; carinæ laterales frontis obtusissimæ; elytra et alæ completa, illa remote venosa; carinæ femorum posticorum inermes, integræ; articulus primus tarsorum posticorum longiusculus. — 1. *Diponthus* STÅL, 1860.
- 2 (1). ♂♀. Lobus anticus pronoti lobo postico longior, cristatus vel tectiformis, margine antico angulum magis minusve distinctum formante; lobus posticus pronoti postice truncatus vel angulum obtusum formans; oculi minus fortiter distantes; costa frontalis minus lata, marginibus saltem partim elevatis instructa; carinæ laterales frontis distinctæ; margo dorsalis femorum posticorum, ante medium saltem, remote serratus vel dentatus.
- 3 (4). ♀. Pronoti dorsum obtuse tectiforme, cum lobis lateribus angulum distinctum, vix tamen carinatum, formans; lobi pronoti sulco profundo separati, lobus posticus brevissimus, postice truncatus; sulci transversi lobi antici in dorso obliterati, sulcus posticus in latera dorsi brevissime extensus; elytra et alæ nulla; tympanum nullum; margines et carinæ fere omnes femorum posticorum denticulati; articuli primus et tertius tarsorum posticorum longitudine subæquales; fastigium verticis leviter declive, cum costa frontali angulum obtusiusculum subrotundatum formans; costa frontalis per totam longitudinem sulcata; carinæ laterales frontis sat obliquæ. — 2. *Antandrus* STÅL, N. G. (Typus: *Podisma viridis* BLANCH.)
- 4 (3). ♂♀. Lobus anticus pronoti in cristam integrum, medio altiore, elevatus, sulcus anticus prope marginem positus

anguste interruptus, sulcus medius obliteratus, sulcus posticus late interruptus et versus marginem posticum lobi ductus; lobus posticus pronoti depressiusculus, leviter carinatus, posterius angulum obtusum vel obtusissimum formans; elytra et alae completa, illa remote reticulata; femora postica in margine dorsali, saltem ante medium, denticulis interdum obsoletis, instructa, carina superior lateris exterioris denticulis praedita; fastigium verticis sat declive; costa frontalis saltem partim sulcata; carinae laterales et margines laterales costae frontis subparallelæ, illæ vix obliquæ; cerci marium breviusculi, teretes, sensim gracilescentes; segmentum dorsale ultimum marium apice inter cercos obtuse sinuatum; lamina supraanalis marium triangularis, in medio transversim subuplicata, lateribus plicæ laminatis vel sublaminatis et nonnihil productis; lamina subgenitalis brevis. — 3. *Dericorys* SERV.

DIVISIO QUARTA.

- 1 (4). ♂♀. Elytra tota remotissime reticulata; lobus anticus pronoti dorso teres, haud cristatus, margine antico sensim obtusissime rotundato; spinæ tibiarum posticarum breves; oculi magni, apud mares maximi et fortiter prominuli.
- 2 (3). ♂. Lobus posticus pronoti tumidus, sensim convexus, lobo antico nonnihil brevior, posterius rotundatus, carina subtili longitudinali instructus; elytra minus lata. — 1. *Oncolopha* STÅL, 1873.
- 3 (2). ♀. Lobus posticus pronoti in cristam altissimam, anterioris supra lobum anticum productam, elevatus, posterius productus et angulum formans, lobo antico multo longior; elytra latiuscula. — 2. *Monachidium* SERV.
- 4 (1). ♂♀. Elytra lata, tota dense reticulata; pronotum dorso per totam longitudinem in cristam altam, erosam, elevatum, antice posticeque in angulum productum, lobo postico lobo antico longiore, crista lobi postici antrorsum supra basin lobi antici producta; spinæ tibiarum posticarum mediocres; oculi mediocres, sat prominuli. — 3. *Antiphon* STÅL.
(= *Monachidium* STÅL, Rec. Orth.)

DIVISIO QUINTA.

- 1 (2). ♀. Costa frontalis inter basin et ocellum plana et sulco destituta, ibidem proportionaliter latior quam in generibus sequentibus, ante ocellum obsoletiuscula, obtuse subsulcata,

apicem versus evanescens; margines laterales fastigii nulli elevati; tempora subperpendicularia; dorsum pronoti callis vel tuberculis parvis destitutum; femora postica valida, lata, parte graciliore apicali breviore quam in generibus sequentibus; tibiae posticae femoribus breviores, superne in margine exteriore spina apicali minutissima et ægre distinguenda armatae. — 1. *Abila* STÅL, N. G.

- 2 (1). ♂♀. Costa frontalis angusta, inter basin et ocellum distincte sulcata et marginibus distinete elevatis instructa, ante ocellum quoque, licet interdum minus distinete, sulcata, ad vel fere ad apicem frontis continuata; fastigium magis minusve, interdum fortissime declive, quod in eodem genere variat, marginibus lateralibus totis vel anterius elevatis et in margines elevatos costæ frontalis continuatis; tempora parva, obliqua; dorsum pronoti antice, sæpe quoque postice, rugulis vel tuberculis nonnullis, magis minusve distinctis, instructum; femora postica minus lata, parte apicali graciliore longiore quam in genere precedente; tibiae posticae femoribus vix breviores; genæ in exemplis rite coloratis fuscæ.
- 3 (4). ♂♀. Tibiae posticæ superne in utroque margine spina apicali distinctissima armatae; dorsum pronoti antice rugulis nonnullis obsoletis instructum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in medio lobulis duobus obtuse subtriangularibus leviter distantibus instructus; lamina supraanalis marium triangularis, longior quam latior, retrorsum per totam longitudinem sensim vel subsensim angustata. — 2. *Aristia* STÅL, 1876.
- 4 (3). ♂♀. Tibiae posticæ superne in margine exteriore spina apicali destitutæ; dorsum pronoti antice, interdum quoque postice, rugulis vel tuberculis parvis distinctis instructum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium lobis duobus dentiformibus distantibus instructus; lamina supraanalis marium a basi ad vel ultra medium sensim leviter angustata vel lateribus parallelis instructa, dein utrimque subito sinuata, pone sinum angusta et sensim angustata. — 3. *Phæoparia* STÅL, 1873.

DIVISIO SEXTA.

- 1 (16). ♂♀. Margo dorsalis femorum posticorum remote vel remotissime serratus; lobi mesosternales plerumque sat distantes; margo exterior loborum lateralium pronoti haud vel subliliter elevatus.
- 2 (15). ♂♀. Lobi mesosternales sat distantes.

- 3 (4). ♂♀. Costa frontalis ante et pone ocellum subito nonnihil coarctata, pone ocellum elevata et cum fastigio antrosum prominula, pone antennas sensim fortiter angustata, basi fortiter compressa; vertex inter oculos leviter declive; fastigium occipite humilius; oculi lati, fortiter convexi; ocellus costæ frontalis ab antennis levissime remotus; pronotum dorso carina media obtusa instructum, lobo postico lobo antico multo breviore, margine postico obtuse rotundato vel angulato, inter medium et humeros utrimque sinuato; elytra angusta, minus dense venosa; tuberculum prosternale crassum, breve, obtusum; pectus angustum; lobi metasternales marium leviter, feminarum magis distantes; femora postica marginè dorsali parce serrato, lobo geniculari exteriore triangulari; tarsi mediocres; tibiæ posticæ in marginè exteriore spinis typice novem armatae; tympana retrorsum leviter vel levissime immersa; cerci marium mediocres, graciliusculi, sensim acuminati, apice subcurvi, vix compressi. — (Gen. 1.) 1. *Coryphistes* CHARP.
- 4 (3). ♂♀. Costa frontalis basi haud vel minus fortiter compressa, haud nisi ante ocellum coarctata; oculi minus lati; tuberculum prosternale alte elevatum; lobi geniculares femorum posticorum apice rotundati.
- 5 (8). ♂♀. Typus americanus; costa frontalis ante ocellum magis minusve distincte coarctata; intervallum loborum mesosternalium haud vel vix transversum; lobi mesosternales haud vel vix transversi; ocellus costæ frontalis a scrobibus antennarum leviter vel levissime remotus; tuberculum prosternale teres vel compressiuseulum, obtusum; tibiæ posteriores extus spinis septem vel octo typice armatae; tarsi anteriores mediocres vel longiusculi; tympana retrorsum leviter immersa; cerci marium cognitorum breves, sensim acuminati, prope basin intus processu armati. — (Gen. 2—3.)
- 6 (7). ♂♀. Costa frontalis ante ocellum utrimque distincte sinuata, ibidem coarctata, pone antennas basin versus sensim angustata; fastigium verticis horizontale, pone medium lateribus subparallelis instructum, ante medium sensim angustatum; antennæ anguste ensiformes; elytra minus dense reticulata, inter costam et radium vena intercalata instructa; cerci marium breves, compressiuseculi, sensim acuminati, intus prope basin processu sat longo, sub lamina supraanali occulto, instructi; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium lobulis tuberculisque minutis nigris pluribus instructus; lamina supraanalis marium nigro-granulata; lamina subgenitalis marium breviter conica, nonnihil recurva. — 2. *Vilerna* STÅL, 1873.
- 7 (6). ♀. Costa frontalis ante ocellum utrimque non nisi obsoletissime sinuata, per fere totam longitudinem basin versus subsensim angustata; carinæ laterales frontis sensim

distinctius divergentes quam in genere præcedente; antennæ lineares; fastigium verticis sensim angustatum, lateribus posterius nonnihil declivibus; elytra sat dense venosa, ante medium irregulariter reticulata, inter costam et radium vena intercalata destituta; femora postica graciliuscula; tarsi anteriores longi vel longiusculi, antici tibiis ejusdem paris haud multo breviores. — 3. *Nuceria* STÅL, N. G.

- 8 (5). ♂♀. Typus australicus; ocellus costæ frontalis a scrobibus plerumque sat fortiter remotus; costa frontalis ad ocellum haud coarctata; fastigium verticis horizontale et cum occipite in eodem vel fere eodem plano jacens; occiput et vertex plerumque carina longitudinali instructa; pronotum totum vel saltem in lobis lateralibus rugulosopunctatum, interdum granulis rugulisve conspersum, dorso carinatum, teetiforme vel cristatum; elytra in area postradiali confuse reticulata; femora postica lata vel latiuscula; tarsi plerumque breves vel breviusculi; tibiæ posticæ extus spinis septem — novem armatae; cerci marium cognitorum fortiter compressi, laminati, sensim curvati, vel subtus sensim sinuati, apice obtuse vel minus fortiter angustati, breves vel modice elongati; lamina subgenitalis marium brevis, obtusiuscula; tuberculum prosternale obtusum, forma varians. — (Gen. 4—7.)
- 9 (10). ♂♀. Femora postica sat compressa; sulci lobi antici pronoti in medio interrupti; area dorsalis lateris exterioris femorum posticorum lateribus parallelis vel subparallelis instructa, angusta, area discoidalis lata, anterius area illa dorsali quadruplo vel fere quadruplo latior; costa frontalis basi angustissima; intervallum loborum mesosternalium haud transversum. — 4. *Goniaea* STÅL, 1873.
- 10 (9). ♂♀. Femora postica crassiora, minus compressa; area dorsalis lateris exterioris femorum posticorum anterius lata, apicem versus sensim distinctissime angustata, area discoidalis lata, anterius area illa dorsali tantum triplo, vel ne triplo quidem latior; intervallum loborum mesosternalium sæpe transversum.
- 11 (14). ♂♀. Costa frontalis per totam vel magnam partem longitudinis basin versus sensim angustata, basi angustissima, ante ocellum quam pone ocellum haud angustior; carina lobi antici pronoti sulcis transversis duobus intersecta; tympana leviter vel modice immersa.
- 12 (13). ♂♀. Pectus modice latum; fastigium verticis vix vel leviter transversum; intervallum oculorum latiusculum vel modice latum; oculi parte infraoculari genarum nonnihil longiores; tuberculum prosternale obtusum, forma varians; elytra nunc completa, nunc rudimentaria. — 5. *Stropis* STÅL, 1873.

- 13 (12). ♀. Pectus latissimum; fastigium verticis breve, fortiter transversum, obtusissimum; intervallum oculorum latissimum; oculi parvi, parti infraoculari genarum longitudine aequales vel fere breviores; tuberculum prosternale late transversum; elytra rudimentaria, lateralia, angusta, oblonga, fortiter distantia. — 6. *Cratippus* STÅL, 1875.
- 14 (11). ♂♀. Costa frontalis ante ocellum quam pone ocellum angustior, pone antennas basin versus subsensim angustata, basi ipsa proportionaliter latior quam in generibus australicis praecedentibus, parte basali carina longitudinali instructa, parte dimidia apicali lateribus parallelis instructa; angulus apicalis fastigii leviter truncatus; carina lobi antici pronoti sulco tantum uno intersecta, sulcus posterior lobi ad carinam interruptus; tympana posterius fortiter immersa. — 7. *Cirphula*¹⁾ STÅL, 1860.
- 15 (2). ♂. Lobi mesosternales intus fortiter rotundati, ante medium inter se fortiter appropinquati, hinc antrorum et retrorum sensim divergentes; lobi metasternales per magnam partem longitudinis contigui; fastigium verticis horizontale, triangulare, leviter transversum, in plano occipitis jacens; costa frontalis, basi sat compressa excepta, per totam longitudinem excavata et marginibus elevatis instructa, apicem versus lateribus parallelis praedita; oculi mediocres; pronotum granulatum, dorso carina subtili percurrente instructum, sulcis transversis in dorso continuis, lobis aequi longis, postico posterius angulum obtusum formante; elytra ultra medium sat dense irregulariterque reticulata, angustula; tuberculum prosternale teres, obtusum; femora postica modice lata; tarsi anteriores mediocres; cerci maris sat longi, sensim gracilescentes, apice furcati; lamina subgenitalis breviter subconica; habitu et conformatione laborum sternalium hoc genus *Catantopem* memorat. — (Gen. 8.) — 8. *Anthermus* STÅL, N. G.
- 16 (1). ♂♀. Femora postica graciliuscula vel minus lata, sensim angustata, margine dorsali integro, inermi, lobis genicularibus sensim angustatis, apice obtusis, rotundatis; caput nonnihil exsertum; fastigium transversum, obtusum, planum, haud vel levissime declive; intervallum oculorum latum vel latiusculum, parte latissima costæ frontalis haud angustius; tempora perpendicularia, punctata; frons modice obliqua, costa basi angustata, per totam longitudinem sensim ampliata, punctata, marginibus laevigatis, elevatis vel subelevatis; carinæ laterales frontis a marginibus costæ frontalis leviter divergentes; antennæ lineares, mediocres; pronotum totum punctatum, dorso obtuse teres, carina obtusa subtili percurrente instructum, lobo postico posterius obtuse producto, lobo antico breviore, margine exteriore laborum

¹⁾ *Calliptenus carbonarius* SERV. ad *Cirphulam* quoque referendus.

lateralium subrecto, distincte incrassato; elytra minus dense reticulata; vena radialis interior ante medium elytri a vena radiali intermedia quam in plurimis Acrididibus fortius divergens, intervallum, quod in medio elytri inter illas venas exstat, dense transversim venulosum; tuberculum prosternale conicum; lobi mesosternales apud mares levissime, apud feminas leviter distantes; lobi metasternales marium contigui, feminarum distantes; femora postica minus lata; tibiæ posticæ extus spinis sex — octo armatae; tarsi anteriores mediocres vel longiusculi; lamina subgenitalis marium nonnihil producta, sensim subcompresso-angustata; species hujus generis habitu et pictura speciebus quibusdam *Oxyæ* haud dissimiles. — (Gen. 9.)
9. *Aleuas* STÅL, N. G.

DIVISIO SEPTIMA.

Genus unicum: *Acridium* SERV., STÅL.

DIVISIO OCTAVA.

A. Genera orbis antiqui.

- 1 (26). ♂♀. Cerci marium variabiles, numquam prope basin superne subito fortiter sinuati et pone sinum subito recurvi, nec cornei et compressi, nec laminam supraanalem dimidia longitudine superantes; segmentum dorsale ultimum marium normale, breve, haud tumidum; dorsum pronoti in lobos laterales sensim transiens, limite inter dorsum et lobos laterales obtuse vel obtusissime tereti, raro subangulato, angulo numquam carinato, nec toroso, nec lævigate; femora postica margine dorsali serrato vel area dorsali exteriore distincte punctata vel subgranulata instructa; tarsi anteriores mediocres vel longiusculi, intermedii tibiis dimidiis longiores; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio raro nonnihil longior; articulus primus tarsorum anteriorum breviusculus.
- 2 (19). ♂♀. Oculi magis distantes; intervallum oculorum basi costæ frontalis latius vel haud angustius¹⁾; lobi metasternales marium leviter vel levissime, feminarum fortius distantes; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio raro nonnihil longior; tympanum leviter obliquum, retrorsum sensim leviter immersum; frons punctata vel

¹⁾ Excepta *Coptacra præmorsa*, in qua intervallum oculorum basi costæ frontalis angustius est.

granulata; tuberculum prosternale conicum, sæpe sat acuminatum. — (Gen. 1—9, *Teratodes*, *Coptacra* et affinia).

- 3 (8). ♀. Oculi fortiter distantes, breves; intervallum oculorum oculis latitudine subæquale vel latius, parte latissima costæ frontalis saltem duplo latius; vertex maxime declivis; costa frontalis depressa, in fastigium verticis sensim continuata, pone ocellum lata, ante ocellum multo angustata; fastigium verticis maxime declive, apice latum et cum costa frontali confusum; margo dorsalis femorum posticorum serratus vel dentatus; pronotum dorso per totam vel fere totam longitudinem in cristam altam elevatum, anterius angulatum productum; tibiæ posticæ extus spinis octo vel novem armatae. — (Gen. 1—3, *Teratodes* et affinia).
- 4 (5). ♀. Pedes minus validi, mediocres; area dorsalis exterior femorum posticorum modice lata; femora postica haud crassa, supra subtusque latitudine subæqualia; costa frontalis percurrens, tota marginata, ante ocellum angustior, pone ocellum basin versus sensim nonnihil ampliata; oculi parvi, angustiuseuli; pronotum dorso per totam longitudinem in cristam quadrilobam, sulcis transversis intersectam, elevatum; lobus posticus pronoti brevis; elytra angustiuscula, prope basin latiora, hinc sensim angustata, irregulariter, ante medium densius, reticulata; lobi mesosternales transversi; intervallum loborum mesosternalium transversum; series exterior spinarum tibiarum posticarum quam series interior minus longe versus basin extensa. — 1. *Ephantus* STÅL, N. G.
- 5 (4). ♀. Pedes validi; femora postica crassa, dorso latiora, area dorsali exteriore latissima; series exterior et interior spinarum tibiarum posticarum versus basin æque longe extensæ; costa frontalis ante medium angustissima; sulci transversi pronoti cristam haud intersecantes vel prope summam cristam fortius impressi; elytra lata, coriacea, densissime irregulariterque reticulata, apicem abdominis haud superantia; lobi mesosternales fere æque longi ac lati; intervallum loborum mesosternalium haud transversum.
- 6 (7). Costa frontalis percurrens, pone ocellum basin versus sensim nonnihil angustata, ad ocellum subito angustata, ante ocellum angustissima, marginibus lateralibus elevatis; oculi angustiuseuli, leviter convexi; pronotum dorso in cristam fortiter compressam, sulcis transversis haud interruptam, postice serratam, præterea integrum, percurrentem, elevatum, antice posticeque acutangulariter fortiterque productum, lobis ambobus longitudine subæqualibus; femora postica in marginibus sat fortiter dentata. — 2. *Teratodes* BRUL.
- 7 (6). ♀. Costa frontalis subpercurrens, ante ocellum lateribus subparallelis instructa, pone ocellum minus subito angu-

stata et proportionaliter minus angusta quam in genere præcedente, marginibus lateralibus elevatis, prope apicem interruptis; oculi latiusculi, sat convexi; pronotum dorso in cristam, erosulam et dentatam, elevatum, antice posticeque obtuse angulariter productum, lobo postico lobo antico multo breviore. — 3. *Althæmenes* STÅL, N. G. (Typus: *Acridium macula lutea* HAAN.

- 8 (3). ♂♀. Intervallum oculorum plerumque angustum vel angustiuseulum, oculis saltem dimidio angustius, rarissime latum et oculis latitudine subæquale; vertex et fastigium haud vel minus fortiter declivia, hoc in costam frontalem sensim arcuatim continuatum, arcu magis minusve obtuso; areæ laterales frontis prope ocellum costa frontalí numquam plus quam duplo vel vix plus quam duplo latiores; antennæ et præsertim ocelli ab oculis leviter vel levissime distantes; pronotum dorso leviter carinatum vel tectiforme, margine antico truncato vel obtusissime angulato; elytra variabilia, nunc completa, nunc rudimentaria, quod in eodem genere, interdum in eadem specie, variat; femora postica marginे dorsali serrulato vel subtilius denticulato instructa, area exteriore superiore area intermedia multo angustiore, his areis inter se angulum obtusum vel obtusissimum, dentibus majoribus destitutum, formantibus. — (Gen. 4 – 9, *Coptacra* et affinia.)
- 9 (16). ♂♀. Elytra macula nigra, nitida, cornea vel subcornea, destituta.
- 10 (13). ♂♀. Pars basalis interantennalis costæ frontalis leviter vel levissime elevata, costa frontalis igitur tota in eodem plano jacens, et, quum a latere examinatur, in medio vel prope medium haud sinuta; cerci marium cognitorum apicem lamineæ supraanalis haud superantes, teretes vel teretiusculi, haud vel obsoletissime compressi, sensim gracilescentes, acuminati vel subacuminati, recti; lamina supraanalis marium cognitorum triangularis, usque a basi sensim angustata.
- 11 (12). ♂♀. Elytra magis minusve abbreviata, apicem abdominis haud superantia, interdum brevissima, rudimentaria, apice rotundata; alæ, quum adsunt, area radiali apice rotundata; tibiæ posticæ intus spinis haud ultra novem armatæ; dorsum pronoti carina media instructum, lobo postico lobo antico breviore, postice angulum obtusum vel obtusissimum formante. — 4. *Bibracte* STÅL, N. G. (Typus: *Acridium Hagenbachii* HAAN.)
- 12 (11). ♂♀. Elytra alæque longa, apicem abdominis et femorum posticorum superantia, illa per magnam partem longitudinis æque lata, apice oblique truncata vel subtruncata; area radialis alarum apice oblique truncata vel subtruncata; tibiæ posticæ intus spuis saltem deceim armatæ; dorsum

pronoti carina media instructum vel tectiforme, interdum acute tectiforme, lobis ambobus longitudine subæqualibus, lobo postico posterius angulum rectum vel fere rectum formante. — 5. *Coptacra* STÅL, 1873.

- 13 (10). ♂♀. Pars basalis interantennalis costæ frontalis magis minusve elevata et parte reliqua costæ altior, costa a latere visa igitur ante hanc partem magis minusve distincte sinuata; costa frontalis angusta, parte dimidia basali lateribus parallelis instructa vel basin versus levissime angustata, intervallo oculorum haud latiore, plerumque angustiore; pronotum leviter vel levissime carinatum, lobo postico, etiam in macropteris, lobo antico breviore; tibiæ posticæ extus spinis septem vel rarius sex armatæ.
- 14 (15). ♂♀. Fastigium verticis sat fortiter declive; tempora distinctissima, ad latera fastigii oblique declivia, triangularia, a fastigio carina separata; pronotum posterius angulum obtusum distinctum formans; elytra nunc completa, apicem femorum posticorum haud superantia, per magnam partem longitudinis sensim angustata, apice rotundata, nunc rudimentaria et circiter duplo longiora quam pone medium latiora; area radialis alarum angustiuscula, apice rotundata; cerci marium fortiter compressi, longi. — 6. *Traulia* STÅL, 1873.
- 15 (14). ♀. Fastigium verticis vix vel levissime declive; tempora obsoleta vel obsoletiuscula, cum fastigio confusa vel ab hoc minus distincte separata; pronotum posterius truncatum; elytra rudimentaria, angustissima, apicem segmenti mediani attingentia, maxime distantia. — 7. *Mesambria* STÅL, N. G.
- 16 (9). ♂♀. Elytra variabilia, completa vel rudimentaria, apice rotundata vel rotundato-truncata, macula nigra, nitida, lœvigata, cornea vel subcornea, notata; pronotum carinatum vel tectiforme.
- 17 (18). ♂♀. Macula nigra elytrorum in area radiali posita; tibiæ posticæ intus spinis saltem novem, extus spinis saltem octo armatæ; cerci maris unici cogniti levissime compressi, usque a basi sensim acuminati, apice integri. — 8. *Gerenia* STÅL, N. G.
- 18 (17). ♂♀. Macula nigra elytrorum in area costali posita; tibiæ posticæ intus spinis octo, extus spinis septem armatæ; cerci marium sat compressi, sensim angustati, apice fissi. — 9. *Sedulia* STÅL, N. G. (Typus: *Traulia specularia* STÅL.)
- 19 (2). ♂♀. Oculi leviter vel levissime distantes; intervallum oculorum, saltem apud mares, basi costæ frontalis angustius; costa frontalis lata vel latiuscula, percurrentis vel

longe versus apicem distinguenda; lobi metasternales marium omnium mihi cognitorum feminarumque plurimarum contigui, saepe per magnam partem longitudinis sutura recta contigui; tibiæ posticæ extus spinis saltem octo armatae; elytra alæque plerumque completa, apicem femorum posticorum superantia, illa angusta vel angustiuseula, apice rotundata; tympana fortiter obliqua, retrorsum fortiter immersa. — (Gen. 10—13, *Catantops* et affinia.)

- 20 (21). ♂♀. Pronotum per totam longitudinem cristatum; fastigium verticis fortius declive; cerci marium recti, leviter compressi, sensim angustati; lamina supraanalis marium triangularis, pone medium fortius angustata; lamina subgenitalis marium produeta, conica, acuminata; tuberculum prosternale acutius conicum. — 10. *Abisares* STÅL, N. G. (Typus: *Monachidium viridipenne* BURM.)
- 21 (20). ♂♀. Dorsum pronoti carina obtusa, leviter vel levissime elevata, interdum obsoleta, instructum; fastigium verticis subhorizontale vel leviter declive; tuberculum prosternale obtusius conicum vel plerumque cylindricum vel apicem versus tumescens.
- 22 (23). ♂♀. Sulcus pronoti posterior, a quo separantur lobi, sulcis reliquis fortior et profundior; cerci marium recti, teretes, sensim acuminati; lamina supraanalis marium triangularis; lamina subgenitalis apice leviter compressa et producta. — 11. *Orbillus* STÅL, 1873.
- 23 (22). ♂♀. Sulcus posterior pronoti sulcis reliquis haud vel vix fortior.
- 24 (25). ♂♀. Cerci marium cognitorum magis minusve curvati; lamina supraanalis marium cognitorum anterius lateribus parallelis instructa vel sensim levissime angustata, posterius fortius angustata; lamina subgenitalis marium magis minusve produeta, plerumque conica, interdum sat acuminata; lobi metasternales in utroque sexu contigui, raro apud feminas levissime distantes; tibiæ posticæ extus spinis salteni novem armatae. — 12. *Catantops* SCHAUM.
- 25 (24). ♀. Lobi metasternales feminarum sat fortiter distantes; tibiæ posticæ extus spinis octo armatae; intervallum oculorum latitudine varians. — 13. *Stenocrobylus* GERST.
- 26 (1). ♂♀. Dorsum pronoti, saltem in lobo antico, cum lobis lateralibus angulum plerumque formans, plerumque quoque ab his lobis carina vel ruga levigata, continua vel interrupta, quam dorso opaco nitidiore, separatum, raro in lobos laterales sensim continuatum; lobe anticus pronoti saepe levigatus vel parce et obsolete vel obsoletissime punctatus; cerci marium plerumque compressi, interdum superne prope basin sinuati et pone sinum subito recurvi; segmentum dorsale ultimum marium interdum maxi-

mum, antrorsum productum, tumidum; femora postica in margine dorsali plerumque, licet interdum remotissime et obsoletissime, serrata; tarsi anteriores proportionaliter breves vel breviusculi, articulo primo plerumque longiore quam in plurimis Acerididibus et articulo tertio saepe haud breviore; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio longior; tympanum macropterorum retrorsum fortiter vel modice immersum. — (Gen. 14—16.)

- 27 (28). ♂♀. Cerci marium basi lati, subtus ampliati, superne prope basin subito fortiter sinuati, pone sinum subito fortiter recurvi; margo posticus segmenti dorsalis ultimi marium sensim late sinuatus, medio nec emarginatus nec bilobus; lamina supraanalis marium brevis, posterius subito maxime angustata, interdum subtruncata, apice in medio tamen in lobum prominula, tuberculis duobus vel quattuor nigris, parvis vel minutissimis, serie transversa positis, instructa; lamina subgenitalis marium brevis, obtusa; intervallum oculorum parte latissima costæ frontalis haud angustius; oculi mediocre; pronotum carina media, interdum cristata, instructum, dorso a lobis lateralibus carina vel ruga magis minusve distincta, interrupta, separato; elytra et alæ completa in mihi cognitis, interdum tamen breviuscula; tuberculum prosternale obtusum, transversum, forma varians; pectus latum; lobi mesosternales transversi; intervallum loborum mesosternalium secundum species latitudine varians, nunc fortiter, nunc leviter transversum; lobi metasternales marium leviter vel levissime, feminarum fortius distantes; femora postica lata vel latissima, margine dorsali serrato; tibiæ anteriores graciliusculæ; tarsi anteriores breves. — 14. *Euryphymus* STÅL, 1873 et 1876.
- 28 (27). ♂♀. Cerci marium prope basin nec profundi sinuati, nec subito recurvi; costa frontalis obtusa, haud nisi ad ocellum subexcavata, percurrens vel subpercurrens, apicem versus tamen sensim humilior; intervallum oculorum costa frontali haud vel paullo angustius; fastigium verticis magis minusve declive, opacum, haud latum, marginibus plerumque obtusis, nitidis; dorsum pronoti opacum, saltem in lobo antico carina vel ruga vel rarius linea nitidiore a lobis lateralibus separatum; margo dorsalis femorum posticorum plerumque, licet interdum remotissime, subtilissime et vix perspicue, serratus; tarsi anteriores breviusculæ; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio longior.
- 29 (30). ♂♀. Segmentum dorsale ultimum marium maximum, tumidum, antrorsum fortiter productum, anterius et lateribus convexo-declive, margine apicali sensim subsinuato, in medio haud nisi obsoletissime emarginato, lobis destituto; cerci marium maximi, longi, toti lati et compressi,

cornei; lamina supraanalis marium triangularis, longior quam latior, lateribus anterius rotundatis vel subparallelis instrueta. — 15. *Calliptenus* SERV.

- 30 (29). ♂♀. Segmentum dorsale ultimum marium magnitudine et forma normale; cerci marium variables, numquam tamen uti in Callipteno formati; lamina supraanalis variabilis; tibiæ posticæ extus spinis numerosis vel saltem novem armatae. — 16. *Euprepocnemis* FIEB.

B. Genera americana¹⁾.

- 1 (30). ♂♀. Lobi ambo dorsi pronoti in eodem plano jacentes, vel lobeus posterior retrorsum sensim adscendens; intervallum oculorum angustum vel modice latum; caput leviter exsertum; tarsi anteriores mediores, articulo primo brevi vel breviusculo.
- 2 (21). ♂♀. Articulus secundus tarsorum posticorum brevis, a supero visus articulo primo plus dimidio brevior.
- 3 (4). ♂♀. Tibiæ posticæ in margine exteriore spinis typice saltem novem armatae; costa frontalis percurrens vel subpercurrens vel ante ocellum distinete continuata, basi obtuse areuatim in fastigium transiens, parte basali in axem corporis haud fortius prominula; lobeus anticus pronoti plerumque laevigatus vel obsolete remoteque punctatus, raro densius et distinetius punctatus vel rugosus, numquam tuberculatus; sulei lobi antici pronoti plerumque subtiliter impressi, in medio dorsi plerumque interrupti vel obsoletiores, suleus posterior ejusdem lobi utrimque versus margines dorsi a suleo lobos separante distinete divergens; femora postica in area dorsali plerumque laevigata, margine dorsali integro, inermi; lamina supraanalis marium cognitorum, saltem anterius, impressione vel suleo longitudinali instrueta; cerci variables, saltem partim plerumque compressi, saepe fortiter compressi et laminati, in medio vel prope medium spina introrsum vergente destituti; oculi leviter vel minus fortiter prominuli, leviter vel minus fortiter convexi; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio plerumque nonnihil longior, articulus secundus brevis; pars illa prosterni, quæ secundum marginem antieum mesosterni extensa est, hand vel leviter tumescens; tuberculum prosternale plerumque fortiter vel sat fortiter elevatum, plerumque conicum; limites inter

¹⁾ In hac divisione querendæ sunt species nonnullæ europææ, in quibus margines dorsi pronoti ruga destituti et lamina supraanalis marium nigro-picta, nec non genus africanum (*Gergis*) in quo dorsum pronoti carina destitutum et teres venæque analis et axillaris in medio elytri confluentes et articulus secundus tarsorum posticorum elongatus.

dorsum et lobos laterales pronoti obtusi, teretes, rarissime ruga longitudinali obsoletiuscula instructi; elytra macropterorum per maximam partem longitudinis apicem versus sensim angustata, remote reticulata; species saepe brachypteræ, rarissime apteræ; habitus singularis; genus europæo-americanum. — (Gen. 17.) 17. *Pezotettix* BURM. (= *Pezotettix* STÅL¹⁾ 1876, *Trigonophymus* STÅL 1873, *Dichroplus* STÅL 1873, *Melanoplus* STÅL 1873, *Hermistria* STÅL 1873, *Hesperotettix* SCUDD., *Paroxya* SCUDD.)

- 4 (3). ♂♀. Tibiae posticæ in margine exteriore spinis haud ultra octo, plerumque tantum sex vel septem armatae; oculi plerumque fortiter prominuli; costa frontalis ante ocellum saepe subito evanescens, parte pone ocellum posita plerumque elevata et in axem corporis antrorsum prominula; cerci marium cognitorum plerumque breves vel breviusculi et recti, saltem apicem versus teretes, styliformes vel conici, intus saepe processu spiniformi armati; pronotum, etiam in lobo antico, plerumque distincte punctatum vel rugosum vel granulatum, interdum tuberculatum, sulcis transversis plerumque fortiter vel quam in *Pezotettige* distinctius impressis, sulcis duobus posterioribus lobi antici in dorso continuis; femora postica in area exteriore superiore plerumque distincte punctata, margine dorsali plerumque, licet interdum obsolete et remotissime, serrato; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio raro longior, interdum brevior; lobi metasternales marium cognitorum magis minusve distantes; species plerumque apteræ; genera habitu singulari plerumque insignia et a *Pezotettige* divergentia.²⁾ — (Gen. 18—26.)
- 5 (20). ♂♀. Margo inferior femorum posticorum per magnam partem longitudinis usque ad lobos geniculares rectus.
- 6 (9). ♂♀. Pars basalis vel interantennalis costæ frontalis ultra planum disci frontis in axem corporis antrorsum haud prominula; costa frontalis latiuscula; cerci marium mediores, toti vel apicem versus graciles, acuminati; oculi leviter vel minus fortiter prominuli.
- 7 (8). ♂♀. Costa frontalis percurrens, inter antennas nonnihil ampliata, basin versus vel pone ocellum plana; fastigium verticis subhorizontale vel leviter declive; oculorum intervallum angustum, costa frontali angustius; pronotum dorso cariua percurrente, in lobo antico interdum sat obsoleta, instructum, sulcis transversis distinctis, lobo postico lobo antico haud vel paullo breviore, posterius angulum di-

¹⁾ Ad *Pezotettigem* sensu strictiore, (vide STÅL, Obs. orth. 2. p. 17) quoque referendi *Pez. nigro-vittatus* STÅL et *glacialis* SCUDD.

²⁾ Genera quaedam, quoad habitum ad *Pezotettigem* appropinquantia, numero spinarum tibiarum autem ab hoc genere divergentia, in conspectu hanc tractavi, quia mares mihi ignoti sunt.

stinctum formante, lobo antico dorso transversim obtusissime convexo; elytra et alae completa; femora postica dorso magis minusve distincte punctata, margine dorsali integro vel subintegro; cerci marium basi compressiusculi, sensim gracilescentes; articuli primus et tertius tarsorum posticorum longitudine æquales; tibiæ posticæ extus spinis octo armatae; intervallum loborum metasternalium lateribus rectis et parallelis instructum; lobi metasternales angulo apieali iuxtiore distincto, recto. — 18. *Osmilia* STÅL, 1873.

- 8 (7). ♂♀. Costa frontalis versus apicem frontis evanescens, inter antennas haud ampliata; fastigium verticis sat declive, in costam frontalem sensim continuatum; intervallum oculorum latiusculum, costa frontali paullo latius; pronotum dorso teres, sulcis transversis fortiuscule impressis, sulco illo, qui prope marginem positus est, etiam in dorsum continuatus et in medio anguste interruptus; lobus posticus pronoti posterius rotundatus, carina media instructus, lobus anticus carina destitutus; elytra rudimentaria vel fortiter abbreviata; lobi mesosternales divergentes; femora postica dorso subimpunctata, margine dorsali integro, inermi; tibiæ posticæ extus spinis septem armatae; articulus primus tarsorum posticorum articulo ultimo vix longior; cerci marium mediocres, basi latiusculi, medium versus sensim angustati, parte apicali gracili, tereti, sensim acuminata. — 19. *Dactylotum*¹⁾ CHARP.
- 9 (6). ♂♀. Pars basalis vel interantennalis costæ frontalis ultra planum disci frontis in axem corporis antrorum distincte prominula, quod a latere facile distinguitur; pronotum in lobis ambobus carina dorsali plerumque destitutum; femora postica dorso plerumque distincte punctata vel granulata, margine dorsali plerumque serrato vel dentato; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio haud longior, plerumque brevior; oculi fortiter prominuli.
- 10 (11). ♂♀. Corpus apterum, dorso, etiam in abdome licet remotius et subtilius, punctatum, rugosum vel granosum; cerci marium breves, teretes, sensim acuminati, intus tuberculo vel processu destituti; lamina supraanalis marium usque ad apicem sensim angustata, triangularis, lateribus haud emarginatis; articulus tertius tarsorum sat longus; intervallum oculorum angustum vel angustiusculum; costa frontalis angusta vel angustiuscula; pronotum basi truncatum, lobo postico fortiter abbreviato, sulcis transversis distinctissimis vel sat fortiter impressis, sulco illo, qui prope marginem anticum positus est, etiam in dorsum continuato, in medio tamen interrupto, margine antico

¹⁾ *Pezotettix picta* THOM.; *Dact. bicolor* CHARP. mihi ignotum.

dorsi saepe nonnihil adscendente et producto; lobi mesosternales sat fortiter divergentes. — 20. *Rhytidochrota* STÅL, 1873.

- 11 (10). ♂♀. Corpus alatum vel rudimento elytrorum, interdum minutissimo, squamulam parvam simulante, instructum; cerci marium breves vel breviusculi, teretes, plerumque crassi, sensim acuminati, intus tuberculo vel processu spiniformi vel filiformi armati; lamina supraanalis marium lateribus pone medium vel prope apicem magis minusve distinete sinuatis instructa; lobi laterales pronoti extus pallidi.
- 12 (15). ♂♀. Pronotum inter dorsum et lobos laterales subrugoso-elevatum vel serie tuberculorum instructum; dorsum pronoti in linea media tuberculis acutis, compressis, instructum, margine postico medio dente recurvo armato; femora postica in carinis tuberculata vel dentata, dorso spina apicali magna terminata; costa frontalis angusta, marginata; articulus tertius tarsorum sat longus; vertex inter oculos tuberculo parvo instructus.
- 13 (14). ♂♀. Fastigium verticis distinete declive; pars interantennalis costae frontalis ante fastigium prominula; dorsum pronoti teetiforme; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium inermis; cerci marium graciliusculi, prope apicem intus tuberculo parvo obtuso instructi; lamina supraanalis marium granulis destituta; lobi mesosternales haud divergentes. — 21. *Polysarcus* SAUSS.
- 14 (13). ♂. Fastigium verticis horizontale; pars basalis costae frontalis ante fastigium haud prominula; dorsum pronoti haud teetiforme; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium obtuse quinque-dentatus; cerci marium breves, crassi, intus ante medium processu spiniformi, introrsum et antrorsum vergente, sub lamina supraanalii extenso, armati; lamina supraanalis biseriatim granosa; lobi mesosternales divergentes. — 22. *Nicarchus* STÅL, N. G.
- 15 (12). ♂♀. Pronotum dorso teres, inter dorsum et lobos laterales nec tuberculatum, nec rugoso elevatum; lobus anticus pronoti tuberculis compressis et acutis destitutus; margo posticus lobi postici pronoti dente recurvo destitutus; femora postica dorso spina apicali parva vel minutissima terminata, margine dorsali serrato; cerci marium crassi, breves, intus ante medium processu longo, spiniformi vel subfiliformi, introrsum vergente, sub lamina supraanalii extenso, armati; costa frontalis angusta vel angustiuscula; intervallum oculorum angustum vel angustiusculum; fastigium verticis distinete declive.
- 16 (19). ♂♀. Articulus apicalis palporum maxillarium haud ampliata, haud nisi levissime compressa; elytra et alae completa.

- 17 (18). ♂♀. Pronotum dorso carina longitudinali destitutum, lobo antico in linea media bituberculato, lobo postico horizontali, basi obtuse angulato, crista destituto; elytra angusta, sensim angustata; alae minus longæ, obtusæ; tuberculum prosternale acuminatum, basi crassum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in medio processu lato, truncato, fisso, bilobo, lobis apice extus dente armatis; lamina supraanalis marium triangularis, lateribus longe versus apicem sensim leviter rotundatis; lobi mesosternales haud vel obsoletius divergentes. — 23. *Antiphanes* STÅL, N. G. (Typus: *Ommatolampis nodicollis* BURM.)
- 18 (17). ♂. Pronotum dorso in lobo postico carina longitudinali, retrorsum sensim cristato-elevata, instructum, lobo postico basi obtusissime subrotundato, retrorsum sensim adscendente; elytra sensim angustata; alae latæ, obtusæ; tuberculum prosternale obtusissimum, leviter elevatum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in medio levissime prominulus; lamina supraanalis marium brevis, transversa, lateribus in medio angulum distinctum formantibus, pone angulum leviter sinuatis; lobi mesosternales haud divergentes. — 24. *Demonax* STÅL, N. G.
- 19 (16). ♂♀. Articulus apicalis palporum maxillarum ampliatus, compressus, laminatus; pronotum dorso teres, carina destitutum, basi subsinuato-truncatum, lobo postico brevissimo; elytra rudimentaria, lateralia, angusta; tuberculum prosternale acuminatum, spiniforme; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi in medio leviter emarginatus, inermis; lamina supraanalis marium apicem versus sensim angustata, apice subito fortius angustata; articulus ultimus tarsorum longus; lobi mesosternales divergentes; habitus *Rhytidochroæ*. — 25. *Ommatolampis* BURM., SAUSS.
- 20 (5). ♂♀. Margo inferior femorum posticorum ad lobos geniculares subito distinetissime sinuatus, sinum versus sensim leviter dilatatus; costa frontalis percurrens, marginata, tota in eodem plano jacens, basi angustata et sulcata, sulco in apicem fastigii continuato; fastigium verticis levissime declive, subhorizontale; pronotum dorso teres, carina destitutum, sulcis transversis quattuor sat fortiter impressis, omnibus continuis, instructum, lobo postico brevi, basi emarginato-truncato, dense distineteque punctato, lobo antico parce obsoleteque punctato; elytra rudimentaria, elongata, angusta, distantia; margo dorsalis femorum posticorum inermis; articuli primus et tertius tarsorum posticorum longitudine subæquales; segmentum dorsale ultimum marium apice in medio emarginatum; cerci marium compressi, a latere visi sensim acuminati, intus processu medio spiniformi armati; lamina supraanalis retrorsum sensim rotundato-angustata. — 26. *Agesander* STÅL, N. G.

- 21 (2). ♂♀. Articulus secundus tarsorum posticorum quam in plurimis reliquis Acrididibus longior, parte dimidia articuli primi longior, interdum articulo primo longitudine subæqualis; oculi sat convexi et prominuli; pars interantennalis vel basalis costæ frontalis ultra planum disci frontis haud vel raro levissime prominula; intervallum oculorum angustum vel angustissimum; pronotum dorso teres, in lobis ambobus punctatum, carina longitudinali plerumque destitutum, rarius carina obsoleta, vix nisi in lobo postico distinguenda, instructum, lobo postico lobo antico breviore, plerumque multo breviore, basi truncato vel obtuse rotundato vel rotundato-angulato; elytra interdum rudimentaria, in mihi cognitis numquam deficientia; margo dorsalis femorum posticorum inermis; lobi geniculares femorum posticorum apice in angulum terminati; genera habitu singulari et longitudine articuli secundi tarsorum posticorum *Tæniophoræ* et affinibus similia, sed tibiis posticis in margine exteriore spina apicali destinatis ab his generibus divergentia. — (Gen. 27—31.)
- 22 (29). ♂♀. Venæ analis et axillaris elytrorum libere excurrentes; tibiae posticæ spinis paucis, in margine exteriore typice haud ultra sex vel septem, raro in una tibia octo, armatae; margo dorsalis femorum posticorum inermis; genera americana, elytris rudimentariis interdum instructa.
- 23 (26). ♂. Cerci marium intus spina introrsum vergente armati; fastigium verticis distinctius prominulum, magis minusve declive; frons fortius obliqua.
- 24 (25). ♂. Costa frontalis fere usque ad apicem frontis extensa, ante ocellum tamen obsoletiuscula, inter antennas et apicem obtuse sulcata; fastigium verticis apice truncatum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in medio angulatiter emarginatus, ad emarginaturam utrinque dente acuto, toto vel apice nigro, armatus; cerci marium magni, longi, validi, cornei, in margine dorsali intus nigro-tuberculati, subtus dente medio armati, pone dentem sensim angustati, intus prope dentem illum dente introrsum vergente prædicti; lamina supraanalis marium granulis destituta, pone medium rotundato-angustata; articuli primus et secundus tarsorum posticorum longitudine subæquales. — 27. *Proctolabus* SAUSS.
- 25 (24). ♂. Costa frontalis ante ocellum oblitterata; fastigium verticis brevius quam in genere præcedente, apice obtuse rotundatum; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium lobis quattuor obtusissimis brevissimisque nigris instructus, inter lobos medios leviter emarginatus; cerci mediocres, sensim gracilescentes, intus spina introrsum vergente armati; lamina supraanalis marium subtriangularis, anterius tuberculis duobus parvis distantibus nigris

instructa; articulus primus tarsorum posticorum articulo secundo fere duplo longior. — 28. *Anniceris* STÅL, N. G.

- 26 (23). ♂♀. Cerci marium simplices, inermes; fastigium verticis minus prominulum, obtusum, transversum; frons minus obliqua; costa frontalis longe versus apicem frontis extensa, ante ocellum tamen obsoletiuscula; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium cognitorum inermis, in medio leviter sinuatus; lamina supraanalis tuberculis destituta; frons breviuscula.
- 27 (28). ♂♀. Frons distinctius obliqua; costa frontalis ante ocellum leviter excavata, inter antennas latior, hinc basin versus et antrorum ultra ocellum sensim distincte angustata; fastigium sat declive; oculi fortiter divergentes; pronotum distincte punctatum, basi truncatum, lobo postico brevissimo; elytra rudimentaria; articulus secundus tarsorum posticorum articulo primo paullo brevior; tuberculum prosternale subconicum. — 29. *Dellia* STÅL, N. G.
- 28 (27). ♂♀. Frons levissime obliqua; costa frontalis ante ocellum subsubito coaretata et sulcata, basi haud vel vix angustata; fastigium leviter vel levissime declive; oculi sat fortiter divergentes; pronotum fortiter punetatum, lobo postico lobo antico nonnihil breviore, postice rotundato-angulato; elytra alaeque completa, apicem femorum posticorum superantia; articulus secundus tarsorum posticorum articulo primo distincte brevior. — 30. *Coscineuta* STÅL, 1873.
- 29 (22). ♂. Vena axillaris fere in medio elytri cum vena anali confluens; frons brevis; costa frontalis ante ocellum subito abbreviata; fastigium breve, sat declive; oculi fortiter divergentes; pronotum totum punetatum, dorso teres, basi obtuse angulatum; tuberculum prosternale breve, obtusum; lobi metasternales sutura recta et longa contigui; tibiæ posticae extus spinis octo vel novem armatae; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium in medio sat fortiter sinuatus, ad sinum utrimque lobatus; cerci marium medioeres, recti, sensim aeuminati, inermes; lamina supraanalis marium triangularis, longiuscula; articulus primus tarsorum posticorum articulo secundo fere dimidio longior; genus africanum. — 31. *Gergis* STÅL, 1875.
- 30 (1). ♀. Lobus posticus pronoti elevatus, posterius horizontalis, antice declivis, basi obtuse rotundatus; lobus anticus pronoti dorso teres; sulci transversi pronoti distincti, posterior sat fortiter impressus, sulcus ille anticus, qui in Acridiidibus plurimis tantum in lobis lateralibus distinguatur, etiam per dorsum continuatus; caput magnum, sat fortiter exsertum; vertex cum fastigio fortiter declivis; costa frontalis latiuscula, anterius sensim ampliata; carinæ

laterales frontis sat fortiter divergentes; intervallum oculorum latum; oculi parviusculi, lati; elytra et alæ angusta, longa; tuberculum prosternale sat longum, teres, sensim acuminatum; intervallum loborum mesosternalium angustum, medio coarctatum; femora et tibie anteriora proportionaliter brevia; tarsi anteriores longi, articulo primo longo; pedes postici longi, femoribus gracilibus, margine dorsali inermibus; tibie posticæ extus spinis octo vel novem armatae; articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio fere longior, articulus secundus longiusculus, articulo primo tamen plus dimidio brevior; valvulae genitales subrectæ, inermes. — (Gen. 32.) 32. *Adimantus* STÅL, N. G. (Typus: *Oxya ornatissima* BURM.)

DIVISIO NONA.

- 1 (2). ♂. Caput fortius exsertum; fastigium longum, porrectum; costa frontalis pone ocellum sulcata, inter antennas fortiter coarctata et ibidem sulco destituta, pone antennas basin versus sensim angustata; sulci pronoti fortiter impressi; tuberculum prosterni apice leviter ampliatum. — 1. *Opomala* SERV., BURM. (Gen. ins.)
- 2 (1). ♂♀. Caput minus fortiter exsertum, fastigium breve; costa frontalis pone ocellum haud vel obsolete sulcata, inter antennas haud coarctata; sulci pronoti subtile; tuberculum prosternale apice fortiter ampliatum. — 2. *Copicerca* BURM.

DIVISIO DECIMA.

- 1 (8). ♂♀. Lobi mesosternales magis minusve distantes; elytra et area radialis alarum apice rotundata vel rotundato-subacuminata; margo exterior loborum lateralium pronoti distinete rotundato-angulatus.
- 2 (5). ♂♀. Caput levigatum, nitidum; lamina supraanalis maris unici cogniti retrorsum sensim angustatum, lateribus rectis, integris; fastigium verticis breve, obtusum, rotundatum; pronoti lobus posticus basi obtuse angulatus vel subangulatus, angulo ipso leviter sinuato; elytra apicem femorum posticorum haud superantia; tuberculum prosternale spiniforme, acuminatum; margines intervalli loborum mesosternalium recti, paralleli vel subparalleli; spinæ marginis exterioris tibiarum posticarum sex—octo. — (Gen. 1—2.)
- 3 (4). ♂♀. Caput leviter exsertum; frons leviter declivis; costa frontalis obtusa, haud sulcata, ante ocellum evanescens;

fastigium verticis nonnihil declive; intervallum loborum mesosternalium lobis haud multo angustius, fere æque longum ac latum; lobi metasternales in maribus leviter, in feminis magis distantes; segmentum dorsale ultimum marium apice quadridentatum, dentibus duobus mediis fortiter appropinquatis, lateralibus ante angulos basales laminæ supraanalis positis. — 1. *Tetrataenia* STÅL, 1873.

- 4 (3). ♀. Caput magis exsertum; frons fortius obliqua; costa frontalis pereurrens, per totam longitudinem late sulcata; fastigium verticis subhorizontale; intervallum loborum mesosternalium angustum, longius quam latius; lobi metasternales contigui. — 2. *Mastusia* STÅL, N. G.
- 5 (2). ♂♀. Caput saltem in fronte genisque punctatum; lamina supraanalis marium posterius subito angustata; segmentum dorsale ultimum marium apice in medio lobulis vel dentibus duobus parvis, obtusis, nigris, instructum; lamina supraanalis marium in angulis basalibus macula vel tuberculo parvo nigro notata; lamina subgenitalis marium brevis, sensim angustata; pronotum dense punetatum, margine basali medio integro; elytra apicem femorum posticorum plerunque superantia. — (Gen. 3—4.)
- 6 (7). ♂♀. Fastigium verticis carina longitudinali instructum, subæquilaterum vel longius quam latius, triangulare, marginibus lateralibus acutiusculis, cariniformibus; frons sat fortiter obliqua; costa frontalis angusta, tantum inter antennas distinctius elevata; tuberculum prosternale graciliusculum, sensim acuminatum; sulci transversi areæ exterioris mediæ femorum posticorum continui, sensim arcuati vel subarcuati, sulculo longitudinali haud conjuncti; margo basalis dorsi pronoti sensim rotundatus; antennæ ab ocello costæ frontalis longe remoti; oculi sat prominuli, plus quam dimidii ante antennas extensi, in vertice levissime distantes; lobi mesosternales magis minusve distantes; lobi metasternales marium contigui, feminæ unicæ mihi cognitæ nonnihil distantes. — 3. *Stenopola* STÅL, 1873 (= *Oxyblepta* STÅL, 1873.)
- 7 (6). ♂♀. Fastigium verticis carina destitutum, marginibus apud mares acutiusculis; frons sat obliqua; costa frontalis minus angusta, inter antennas minus elevata; tuberculum prosternale conicum, apud feminas crassior et subcylindrica; sulci transversi areæ exterioris mediæ femorum posticorum angulati, plurimi sulculo longitudinali medio conjuncti; margo basalis dorsi pronoti obtuse angulatus; antennæ ab ocello costæ frontalis leviter remotæ; oculi minus prominuli, circiter dimidii ante antennas extensi, in vertice nonnihil magis distantes quam apud species generis præcedentis; lobi mesosternales sat distantes; lobi metasternales in utroque sexu contigui; lamina supra-

analis marium basi utrimque tuberculo parvo nigro, anteriorius carinis duabus longitudinalibus appropinquatis et pone medium tuberculis duobus nigris instructa. — 4. *Cornops* STÅL (=? *Cornops* SCUDD.) (Typus: *Aceridium longipenne* DE GEER.)

- 8 (1). ♂♀. Lobi mesosternales et metasternales utriusque sexus per magnam vel maximam partem longitudinis sutura recta contigui; elytra et alae acuminata vel subacuminata, longa, angusta; corpus angustum, elongatum; pronotum dense punctatum; pectus angustum; fastigium horizontale; articulus primus tarsorum anteriorum longiusculus; costa frontalis percurrens vel subpercurrens, basi excepta sulcata. (Gen. 5—6.)
- 9 (10). ♂♀. Caput pronoto nonnihil brevius, minus fortiter exsertum; fastigium medioere, marginibus minus compressis; costa frontalis basi ipsa leviter angustata; pronotum basi obtuse rotundatum; elytra alaeque leviter acuminata; tuberculum prosternale teres, obtusum; lamina subgenitalis marium fortiter producta. — 5. *Arnilia* STÅL, 1873.
- 10 (9). ♂♀. Caput pronoto longitudine subaequale vel plerumque longius, fortiter exsertum; fastigium magnum, horizontale, antrorsum sensim angustatum, marginibus saltem ante medium compressis; frons fortiter obliqua; costa frontalis basi fortiter compressa; pronotum basi obtusum et plerumque rotundatum; elytra alaeque plerumque longissima et fortiter acuminata, raro abbreviata et apice rotundata; tuberculum prosternale obtusum, interdum compressum; lamina subgenitalis marium producta. — 6. *Leptysma* STÅL, 1873.

DIVISIO UNDECIMA.

- 1 (12). ♂♀. Limbus costalis elytrorum per totam longitudinem late membranaceus et reticulo destitutus; antennae longissimae, plerumque quoque gracillimae; lobi geniculares femorum posticorum triangulares, interdum sat acuminati; tibiae et tarsi postici sat dense et longe pilosi; tarsi postici longi, articulo secundo elongato; costa frontalis ad sulculos transversos frontis subito abbreviata; fastigium declive; oculi plerumque fortiter divergentes, plerumque et praesertim apud mares fortiter prominuli; spinae tibiarum posticarum parvae vel parviusculae. — (Gen. 1—6.)
- 2 (7). ♂♀. Intervallum oculorum minus angustum, costa frontali latius vel saltem haud angustius; articulus primus antennarum intervallo oculorum haud latior; area analis elytrorum percurrens, per totam longitudinem lata, apicem

versus hand vel levissime angustata; lobi metasternales, etiam in feminis mihi cognitis, per magnam partem longitudinis sutura recta et longa contigui; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium obtuse emarginatus, lobulis duobus magis minusve obtusis dentiformibus instructus, vel lobulorum loco leviter angulatim ampliatus; cerci marium recti, teretes, sensim acuminati; lamina subgenitalis marium brevis, obtusa; genera asiatica. — (Gen. 1—3.)

- 3 (6). ♂♀. Caput fortius exsertum, lobo antico pronoti longius; tuberculum prosternale apicem versus transversim ampliatum, apice latum, truncatum; tympanum adest mediocre, haud vel leviter obliquum.
- 4 (5). ♂♀. Oculi lati, subrotundati, fortissime divergentes; frons brevis, carinis lateralibus fortiter divergentibus, obtusis; pronotum breve, basi obtusissime rotundatum, sulcis transversis fortiter impressis, lobo postico brevissimo; femora postica latiuscula, laevigata, margine dorsali in medio hic illuc levissime obsoleteque subinciso; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis quattuor armatae; articuli primus et secundus tarsorum posticorum æque longi. — 1. *Cranaë* STÅL, N. G.
- 5 (4). ♂. Oculi latiuscule ovales, minus fortiter divergentes; frons longior et magis obliqua quam in genere præcedente, carinis lateralibus oblitteratis; pronotum minus breve, lobo postico producto, postice angulum obtusum formante, sulcis transversis subtilibus; femora postica modice lata, in carinis marginibusque granulata; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis septem vel octo armatae; articulus primus tarsorum posticorum articulo secundo nonnihil longior. — 2. *Lucretilis* STÅL, N. G.
- 6 (3). ♂♀. Caput leviter exsertum, lobo antico pronoti haud longius; frons brevis, carinis lateralibus obtusissimis, obsoletis, sat divergentibus; oculi magni, late ovales, modice prominuli, fortiter divergentes; pronotum postice productum et subangulato-rotundatum, angulo ipso obtuse rotundato, sulcis transversis distinctis; tuberculum prosternale breviter subeonicum; tympanum nullum; femora postica lata, in margine dorsali sat dense serrata; tibiæ posticæ in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis septem vel octo armatae; articulus primus tarsorum posticorum articulo secundo circiter dimidio longior; valvulae genitales feminarum rectæ, inermes, teretusculæ. — 3. *Phe-monoë* STÅL, N. G.
- 7 (2). ♂♀. Intervallum oculorum utriusque sexus angustissimum, costa frontali et articulo primo antennarum angustius; elytra interdum rudimentaria; lobi metasternales apud mares con-

tigui vel leviter distantes, apud feminas magis distantes; tympanum parvum, haud immersum, vel nullum; genera americana. — (Gen. 4—6.)

- 8 (9). ♀. Costa frontalis inter antennas fortiter elevata, in axem corporis antrorsum prominula et a latere visa rotundata, inter antennas et sulculos sulcata; frons minus brevis; articulus primus antennarum, solus qui restat in exemplo descripto, magnus, costa frontali fere latior; pronotum posterius modice productum et sensim rotundatum; tuberculum prosternale obtuse subconicum; lobi mesosternales sat distantes, sensim leviter divergentes; lobi metasternales modice distantes; pedes postici — ? — 4. *Nautia* STÅL, N. G.
- 9 (8). ♂♀. Costa frontalis inter antennas leviter vel modice elevata; frons brevis vel breviuscula; articulus primus antennarum costa frontali angustior vel haud latior; femora postica in margine dorsali magis minusve distincte serrata; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis sex vel septem armatæ; tarsi postici longi, articulo secundo articulo primo longiore vel haud breviore; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium cognitorum obtuse emarginatus, inermis; lamina subgenitalis marium obtusa.
- 10 (11). ♂♀. Frons et pronotum dense fortiterque punctata; costa frontalis inter antennas et sulculos transversos frontis fortiter punctata; carinæ laterales frontis obliterate; oculi minus prominuli; pronotum carina destitutum, basi subtruncatum vel sensim obtuse rotundatum; tuberculum prosternale obtusissimum; cerci marium teretiuseculi, sensim acuminati; valvulae genitalis seminarum rectæ, inermes, graciles. — 5. *Ophthalmolampis* STÅL. (=? *Ophthalmolampis* SAUSS.) (*Tæniophora geniculata* STÅL ad hoc genus referenda.)
- 11 (10). ♂♀. Frons et lobus anticus pronoti laevigati vel parce et subtilius punctati; costa frontalis inter antennas et sulculos transversos laevigata vel parce et minus fortiter punctata; carinæ laterales frontis obtusissimæ, obsoletæ; oculi fortius prominuli; pronotum basi truncatum vel, in speciebus, quarum elytra et alæ magis explicata sunt, obtuse angulatum, lobo postico carina subtili instructo; tuberculum prosternale obtusissimum et apice posterius tuberculo parvo instructum; cerci marium cognitorum compressiuseculi, toti latiuseculi, apice truncati vel sinuato-truncati; valvulae genitales feminæ unicæ cognitæ prismatice, formæ normalis. — 6. *Tæniophora* STÅL, 1873.
- 12 (1). ♂♀. Elytra, quum adsunt, usque ad marginem costalem reticulata vel venosa, margine costali non nisi anterius interdum angustissime membranaceo et enervi.

- 13 (14). ♂. Pronotum dorso pone sulcum posticum lobi antici elevatum, posterius levissime productum et obtuse subrotundatum, sulcis transversis fortiuscula impressis, margine antico bituberculato; caput latiusculum; frons brevis, carinis lateralibus leviter divergentibus; costa frontalis lata, longitrorsum obtuse excavata, basi sinuata; fastigium verticis breve, transversum, apice et lateribus sinuatum; oculi late ovales, sat fortiter prominuli, fortissime divergentes, intervallo sat lato distantes; tuberculum prosternale obtusissimum, leviter elevatum; tympanum parviusculum; femora postica compressa, in carinis exterioribus et in marginibus dorsali et inferiore serrata, margine inferiore a basi ad capitulum geniculare recto, margine dorsali subsensim arcuato, areis superiore et iuferiore lateris exterioris ubique latitudine æqualibus, marginibus parallelis instructis; tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis quattuor armatæ; tarsi postici longi, articulis primo et tertio longitudine subæqualibus, articulo secundo paullo longioribus; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi maris ante laminam supraanalem sensim obtuse sinuatum, et lobulos quinque nigros emittens; lamina supraanalis triangularis, marginibus lateralibus dente fere medio instructis; cerci maris validi, lati, compressi, haud longi, ante medium subito fortiter angulatim curvati; lamina subgenitalis conica, haud longa; lobi metasternales sutura longa recta contigui. — (Gen. 7.)
7. *Mezentia* STÅL, N. G.
- 14 (13). ♂♀. Pronotum posterius haud elevatum.
- 15 (20). ♀. Femora postica minus compressa, a supero visa versus capitulum geniculare distinete gracilescens, areis superiore et inferiore lateris exterioris anterius latioribus, hinc retrorsum sensim distinete angustatis; tympanum adest; articulus secundus tarsorum posticorum brevis vel minus longus; costa frontalis angusta vel angustiuscula, ante sulculos discoidales haud vel breviter et obsolete continuata; lobi metasternales feminarum sat fortiter distantes; intervallum oculorum angustiusculum vel modice latum; fastigium magis minusve declive; maris ignoti. — (Gen. 8—10.)
- 16 (17). ♀. Articulus ultimus palporum maxillarium compressus, latus, lamelliformis; oculi fortiter prominuli; pars basalis costæ frontalis sat prominula; pronotum posterius fortiter productum; articulus secundus tarsorum posticorum nonnihil elongatus; tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis sex armatæ. — 8. *Trybliophorus* SERV.
- 17 (16). ♀. Articulus ultimus palporum maxillarium teretiuseulus, haud dilatatus; pronotum basi truncatum, lobo postico brevissimo; articulus secundus tarsorum posticorum brevis,

articulo primo dimidio brevior; habitus Ommatolampidis, sed oculis minus prominulis.

- 18 (19). ♀. Frons ante medium planiuscula; costa frontalis sulcata, sulco in fastigium verticis continuata; fastigium angustiusculum; intervallum oculorum costa frontali vix latius; tuberculum prosternale breviter conicum; lobi mesosternales æque longi ac lati, intus rotundati, intervallo lobis angustiore, haud transverso; carinæ femorum posticorum denticulatae; corpus apterum. — 9. *Hisychius* STÅL, N. G.
- 19 (18). ♀. Frons ante medium transversim convexiuscula; costa frontalis sulco destituta; fastigium sulco nullo nisi obsoletissimo subtilissimoque instructum, transversum; intervallum oculorum costa frontali duplo latius; tuberculum prosternale basi latum, crassum, apice subito acuminatum; lobi mesosternales breves, transversi et intervallo transverso distantes; femora postica in carinis marginibusque inermia; spina apicalis marginis exterioris tibiarum posticarum minutissima, ægerrime distinguenda; elytra rudimentaria, angusta, lateralia. — 10. *Dicæarchus* STÅL, N. G.
- 20 (15). ♂♀. Femora postica magis compressa, a supero visa per totam longitudinem latitudine æqualia vel apicem versus sensim levissime angustata, areis superiore et inferiore lateris exterioris marginibus parallelis instructis; costa frontalis ante sulculos transversos continuata, interdum apicem frontis attingens, cerci marium sensim acuminati. — (Gen. 11—13.)
- 21 (22). ♂. Costa frontalis angusta, nonnihil ante sulculos transversos continuata, sulcata, marginibus elevatis, antice obtusissimis, obsoletis et divergentibus; frons obliqua; fastigium horizontale, leviter sulcatum; vertex inter oculos fastigium versus nonnihil declive; oculi late ovales, haud longi, fortiter prominuli; intervallum oculorum costa frontali distincte latius; pronotum basi truncatum, lobo postico fortiter abbreviato; tuberculum prosternale subtransversum, sat elevatum, truncatum; lobi metasternales levissime distantes; femora postica angusta, lævigata, inermia; artculus secundus tarsorum posticorum elongatus, articulo primo nonnihil brevior; antennæ longæ; tympanum nullum; corpus gracile, apterum. — 11. *Hysia* STÅL, 1875.
- 22 (21). ♂♀. Costa frontalis lata, ante medium angustior, percurrentes vel subpereurrentes, obtusa, haud sulcata; intervallum oculorum, saltem apud feminas, sat latum; pars interocularis verticis et fastigium sat fortiter declivia, hoc obtuse arenatim in costam frontalem continuatum; caput obtusissimum; femora postica apicem abdominis haud superrantia; frons vix vel levissime obliqua; tuberculum proster-

nale leviter elevatum, obtusum vel obtusissimum; articulus secundus tarsorum posticorum articulo primo plus dimidio brevior.

- 23 (24). ♂♀. Latera costæ frontalis inter antennas fortiter declivia; corpus alatum; elytra et alæ apicem abdominis haud superantia, illa densiusculæ et usque ad marginem costalem venosa; pronotum basi leviter productum et sensim rotundatum, sulcæ transversis distinctis, continuis; tibiæ posticæ spinis numerosioribus instructæ, in margine interiore spinis quatuordecim — viginti armatæ, in margine exteriore spina apicali prædictæ; lamina supraanalís mariúm triangularis, lateribus integris. — 12. *Euthymia* STÅL, 1875.
- 24 (23). ♂♀. Latera costæ frontalis inter antennas leviter et oblique declivia; corpus apterum; tympanum nullum; pronotum basi truucatum, sulcæ transversis obsoletissimis, in dorso oblitteratis vel interruptis; tibiæ posticæ spinis minus numerosis, in margine interiore decem vel undecim, intervallo æquali distantibus, armatæ, in margine exteriore spina apicali destitutæ; lamina supraanalís mariúm in medio laterum profunde incisa. — 13. *Lentula* STÅL, N. G.

DIVISIO DUODECIMA.

- 1 (18). ♂♀. Tuberculum prosternale, saltem basi, angustum, teres vel teretiusculum, numquam nisi apicem versus fortius transversim ampliatum; lobi geniculares femorum posticorum plerumque triangulares, apice sæpe fortiter acuminati, rarius apice rotundati; fastigium verticis haud vel leviter declive, plerumque horizontale vel subhorizontale; costa frontalis sulcata; lamina subgenitalis mariúm producta, conica vel acuminata, longitudine varians. — (Gen. 1—9, *Oxya* et affinia.)
- 2 (15). ♂♀. Tuberculum prosternale totum teres vel teretiusculum, subconicum vel subcylindricum, apicem versus haud ampliatum; spina apicalis marginis exterioris tibiarum posticarum distinctissima.
- 3 (4). ♂♀. Caput sat exsertum; fastigium longum, longius quam latius, subtriangulare; frons fortiter obliqua; costa frontalis ante sulculos transversos evanescens, basi ipsa subito fortiter compressa et ibidem sulco destituta; antennæ ab ocello costæ frontalis longe remotæ; oculi parte infraoculari genarum vix vel haud multo longiores, leviter prominuli; lobi mesosternales leviter distantes, metasternales per maximam partem longitudinis sutura longa con-

tigui; anguli apicales dorsales femorum posticorum in spinam acutam producti; lobi geniculares femorum posticorum apice in spinam acutam extensi; tibiæ posticæ laminato-dilatatae, in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis sex vel septem armatae; segmentum dorsale ultimum marium obtuse emarginatum, ad emarginaturam utrimque lobulo brevissimo obtusissimo nigro instructum. — (Gen. 1.) 1. *Quulta* STÅL, 1860.

- 4 (3). ♂♀. Caput leviter vel minus fortiter exsertum; fastigium vertieis breve, oculis multo brevius, plerumque sat fortiter transversum et obtusum; frons minus fortiter obliqua; costa frontalis percurrens, sulco pereurrente vel subpereurrente instructa, basi haud vel leviter compræssa; antennæ ab ocello costæ frontalis leviter remotæ; oculi marium sat prominuli, magni vel majuscenli; anguli apicales dorsales femorum posticorum inermes vel raro spina brevi terminati; segmentum dorsale ultimum marium cognitorum apice obtuse emarginatum, lobulis nigris destitutum.
- 5 (12). ♂♀. Carinæ laterales frontis per totam longitudinem inter ocellos et apicem frontis rectæ vel subrectæ, ocellos versus cum margine oculorum sensim convergentes; intervallum oculorum feminarum parte interantennali costæ frontalis haud vel vix latius; lobi geniculares femorum posticorum acuti; tuberculum prosternale minus gracile; intervallum inter costam et venam radialem anterius biseriatim reticulatum, rarius hic illie triseriatim reticulatum; latera capitis et thoracis vitta obscura postoculari ornata; valvulae genitales marginè denticulatae vel spinulosæ. — (Gen. 2—5.)
- 6 (11). ♂♀. Pronotum minus fortiter punctatum, lobo postico, etiam in brachypteris, parte illa lobi antici, quæ inter sulcos duos posteriores posita est, longiore; elytra numquam squamulam minutissimam simulantia; lobi metasternales marium omnium et feminarum plurimarum contigui; carina dorsalis femorum posticorum apice in denticulum nullum nisi obtusissimum et transversum prominula; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium inter medium et latera haud dilatatus; cerci marium angusti, haud vel leviter compressi; valvulae genitales feminarum in margine exteriore densius denticulatae vel spinulosæ.
- 7 (10). ♂♀. Pars spinosa tibiarum posticarum apicem versus sensim laminato-ampliata; tibiæ posticæ in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis typice septem armatae.
- 8 (9). ♂♀. Fastigium capitis haud vel vix transversum; costa frontalis inter ocellum et apicem angustata; oculi minores; elytra in loco, ubi divergunt venæ radiales duæ interiores, inter venas easdem venulis transversis dense positis instructa; lobi metasternales feminarum distincte nonnihil

distantes; tibiae posticæ in margine interiore spinis octo armatae, intervallo spinarum duarum apicalium intervallis spinarum reliquarum duplo vel triplo longiore. — 2. *Gesonia* STÅL, N. G. (Typus: *Oxya punctifrons* STÅL.)

- 9 (8). ♂♀. Fastigium capitis obtusum, transversum; costa frontalis ante ocellum haud angustata; oculi magni; elytra in loco, ubi divergunt venæ radiales duæ interiores, inter venas easdem venulis transversis remotis instrueta; lobi metasternales utriusque sexus contigui; tibiae posticæ in margine interiore spinis typice decem armatae, intervallis spinarum omnium subæqualibus. — 3. *Oxya* SERV.
- 10 (7). ♂. Margines spinosi tibiarum posticarum haud laminati; tibiae posticæ in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis octo armatae, spinis marginis interioris æque distantibus; oculi magni. — 4. *Caryanda* STÅL, N. G. (Typus: *Oxya spuria* STÅL.)
- 11 (6). ♂. Pronotum fortiter punctatum; lobus posticus pronoti brevissimus, parte pronoti inter sulcos transversos duos posteriores posita haud longior; elytra minutissima, squamulam parvam, pone mesonotum vix extensam, simulantia; lobi metasternales marium levissime distantes; margo exterior tibiarum posticarum, præter spinam apicalem, spinis sex armatus; carina dorsalis femorum posticorum apice in denticulum acutum prominula; oculi magni; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium inter medium et latera fortiter dilatatus; cerci marium lati, compressi. — 5. *Digentia* STÅL, N. G. (Typus: *Oxya punctatissima* STÅL.)
- 12 (5). ♂♀. Carinæ laterales frontis inter oculos primum ab oculis magis distantes, dein ad antennas subito distinete curvati, et inter antennas et ocellos ad oculos fortiter appropinquatae; intervallum oculorum feminarum parte inter-antennali costæ frontalis distinete latius; intervallum inter costam et venam radialem quam in divisione præcedente densius et plerumque confuse pluriseriatim irregulariter reticulatum; tibiae posticæ in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis septem — novem armatae; oculi marium medioeres, feminarum parviusculi; lobi metasternales feminarum plurimarum leviter distantes; valvulae genitales margine inermes vel subinermes; pronotum linea laevigata obsoleta, in lobo postico subelevata, instructum. — (Gen. 6—7.)
- 13 (14). ♂♀. Carina dorsalis femorum posticorum ultra marginem apicalem femorum in dentem acutum prominula; latera capitis et thoraci vitta postoculari fusca ornata; sulci transversi pronoti subtilius impressi; lobi geniculares femorum posticorum triangulares, interdum fortiter acuminati; venæ radiales et costalis elytrorum per magnam partem longitudinis, partibus basali et apicali exceptis,

spinulis erectis vel suberectis minutissimis, ægre perspiciebantur, magis minusve dense positis, instructæ; elytra feminarum ante medium in venis ulnari interiore et anali pilis erectis, magis minusve dense positis, instructa; genus *Oxyæ* simillimum. — 6. *Bermius* STÅL.

- 14 (13). ♂♀. Carina dorsalis femorum posticorum apice in dentem nullum nisi obtusissimum prominula; latera capitis et thoracis vitta fusca destituta; sulci transversi pronoti fortius impressi; lobi geniculares femorum posticorum triangulares, apice interdum rotundati; caput validiusculum; intervallum oculorum apud feminas latum. — 7. *Hieroglyphus* KRAUSS.
- 15 (2). ♂♀. Tuberculum prosternale basi angustum, apice versus sensim transversim ampliatum, apice latum; spina apicalis marginis exterioris tibiarum posticarum minutissima, nutans, ægerrime distinguenda, interdum deficiens; margines tibiarum posticarum haud laminati, margo exterior, præter spinulam apicalem, spinis septem vel octo armatus; lobi geniculares femorum posticorum acuminati. — (Gen. 8—9.)
- 16 (17). ♂♀. Caput minus exsertum; fastigium capitum transversum, apice obtuse rotundatum; frons minus obliqua; carinæ laterales frontis usque ad apicem sensim divergentes; tuberculum prosternale apice bisinuatum; valvulae genitales feminarum margine denticulatae; margines laterales tibiarum posticarum apicem versus acutiusculi. — 8. *Tauchira* STÅL, N. G. (*Oxya polychroa* STÅL et abbreviata SERV.)
- 17 (16). ♂♀. Caput fortius exsertum; fastigium capitum triangulare, apice rotundatum, haud transversum; frons sat fortiter obliqua; carinæ laterales frontis apice fortius divergentes; tuberculum prosternale apice truncatum, integrum vel subintegrum; valvulae genitales feminarum iuermes; margines laterales tibiarum posticarum teretiusculæ. — 9. *Racilia* STÅL, N. G.
- 18 (1). ♂♀. Tuberculum prosternale usque a basi latum et transversum; antennæ breves vel breviusculæ; oculi, præsertim marium, magni vel majusculi; tibiæ posticæ haud dilatatae; lobi geniculares femorum posticorum apice plerumque rotundati; costa frontalis raro sulcata. — (Gen. 10—16, *Platyphyma* et affinia.)
- 19 (26). ♂♀. Intervallum loborum mesosternalium fere æque latum ac longum, lateribus rectis vel subrectis, parallelis vel retrorsum leviter divergentibus, instructum; lobi metasternales, etiam in maribus paucis mihi cognitis, leviter vel levissime distantes; elytra alaque fortiter abbreviata; tympana posterins vix vel levissime immersa.
- 20 (23). ♂♀. Tuberculum prosternale triangulare, apice angulum distinctum formans vel acuminatum; margo dorsalis femorum iuermis, integer; tempora angusta, teretia, haud

disereta; margo exterior tibiarum posticarum, præter spinam apicalem, spinis septem vel plerumque octo armatus. — (Gen. 10—11.)

- 21 (22). ♂♀. Femora postica apicem abdominis sat longe superantia; tuberculum prosternale late triangulare, breve; carina dorsalis femorum posticorum apice in denticulum parvum, acutum, distinctum prominula; lobi geniculares femorum posticorum apice rotundati vel saltem haud acuti; tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis oeto armatae; valvulae genitales feminarum margine inermes. 10. *Praxilla* STÅL, N. G.
- 22 (21). ♀. Femora postica apicem subæquantia; carina dorsalis femorum posticorum in denticulum obtusum, obsoletissimum minutissimumque, prominula; lobi geniculares femorum posticorum triangulares, acuti; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis septem armatae; tuberculum prosternale altius elevatum quam in genere præcedente; valvulae genitales margine denticulatae. — 11. *Cercina* STÅL, N. G.
- 23 (20). ♂♀. Tuberculum prosternale apice truncatum; tempora latiuscula, obliqua, punctata; carina dorsalis femorum posticorum apice haud prominula; lobi geniculares femorum posticorum apice rotundati; margo exterior tibiarum posticarum, præter spinam apicalem, spinis typice novem vel decem armatae; valvulae genitales feminarum margine inermes. — (Gen. 12—13).
- 24 (25). ♂♀. Caput leviter exsertum; carinæ laterales frontis distinctæ; margo exterior loborum lateralium pronoti subtilissime elevatus; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis typice decem armatae; calcaria duo interiora tibiarum posticarum æqualia. — 12. *Platypyma* FISCH. FR.
- 25 (24). ♀. Caput fortius exsertum; carinæ laterales frontis oblitteratae; margo exterior loborum lateralium pronoti latius elevatus et callosus; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis novem armatae; calcaria interiora tibiarum posticarum inæqualia. — 13. *Loryma* STÅL, N. G. (Typus: *Platypyma vittipennis* STÅL.)
- 26 (19). ♂♀. Intervallum loborum mesosternalium multo longius quam latius; lobi metasternales utriusque sexus sutura longa recta per maximam partem longitudinis contigui; elytra alaque completa; caput nonnihil exsertum; margo exterior loborum lateralium pronoti anguste elevatus et callosus; frons magis minusve obliqua; valvulae genitales margine inermes, interdum obsolete subcrenulatae; articulus primus tarsorum posticorum longus; tympana retrorsum fortiter immersa.
- 27 (30). ♂♀. Spiua apicalis exterior tibiarum posticarum distinctissima, spinis reliquis ejusdem marginis haud brevior;

- intervallum loborum mesosternalium in medio vel pone medium fortiter angustatum. — (Gen. 14—15.)
- 28 (29). ♂♀. Costa frontalis sulcata; fastigium carina destitutum; discus elytrorum in loco, ubi divergunt vene radiales duas interiores, inter has venas venuis transversis dense positis instructus; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis novem vel decem armatae; tuberculum prosternale apicem versus haud incrassatum, apice subsinuatum. — — 14. *Spathosternum* KRAUSS.
- 29 (28). ♀. Costa frontalis plana, lata, obtuse marginata; elytra in medio inter venas radiales interiores venuis transversis remotis instructa; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis duodecim vel tredecim armatae; tuberculum prosternale apicem versus ampliatum et incrassatum, apice planum quadratum formans. — 15. *Tristria* STÅL, 1873.
- 30 (27). ♀. Spina apicalis exterior tibiarum posticarum minutissima, ægerrime distinguenda; costa frontalis lata, obtusa, teretiuscula; fastigium cum costa frontali confusum. leviter declive, in costam arcuatim continuatum; pronotum carina obtusa, distinctissima, obtuse callosa, instructum, lobis dorsalibus æque longis; spina prosternalis erecta, apice sinuato-truncata; femora postica ante medium lata, pone medium gracilia, margine dorsali serrato; tibiæ posticæ extus, præter spinulam apicalem, spinis circiter undecim armatae; intervallum loborum mesosternalium lateribus rectis et subparallelis. — (Gen. 16.) 16. *Tylotropidius* STÅL, 1873.

DIVISIO DECIMA TERTIA.

- 1 (10). ♂♀. Antennæ prope oculos insertæ; oculi os versus longe descendentes, maximi; fastigium capitis leviter vel minus fortiter productum; carinæ laterales frontis distinctæ; caput pone fastigium inter oculos transversim impressum; vertex carinatus; lobi mesosternales et metasternales per maximam partem longitudinis sutura recta contigui; tibiæ posticæ in margine exteriore spina apicali armatae; tympana fortiter immersa. — (Gen. 1—5.)
- 2 (3). ♂♀. Fastigium capitis leviter prominulum, apice angulum rectum vel obtusum formans; tempora per totam longitudinem fastigii extensa; frons modice obliqua; costa frontalis tota obtusa, basin versus sensim angustata, basi haud compressa; antennæ lineares; pronotum dorso depresso-uscum, postice angulum obtusum formans; femora postica apicem abdominis attingentia vel subattingentia, lobis genicularibus triangularibus vel subtriangularibus, apicem femorum haud superantibus; pedes anteriores medi-

ocres; femora intermedia apicem coxarum posticarum attингentia; tibiæ posticæ in margine exteriore, præter spinam apicalem, spinis saltem duodecim armatæ; elytra apicem abdominis superantia; corpus minus gracile. — (Gen. 1.)
1. *Oxyrrhepes* STÅL, 1873.

- 3 (2). ♂♀. Fastigium capitis longius productum, saltem æque longum ac latum; tempora plana, fastigio breviora; frons fortiter obliqua; costa frontalis basi vel basin versus magis minusve compressa, dein apicem versus sensim ampliata et marginata, parte basali compressa immarginata, haud sulcata; dorsum pronoti teres; femora postica abdomine breviora, plerumque multo breviora; elytra apicem abdominis haud superantia; corpus gracile.
- 4 (9). ♂♀. Caput ante oculos minus fortiter productum, pro-noto longitudine subæquale; fastigium capite reliquo multo brevius; antennæ capite longiores; margo exterior loborum lateralium pronoti rectus; lobi geniculares apicem femorum posticorum haud superantes. — (Gen. 2—4.)
- 5 (8). ♂♀. Antennæ crassiusculæ, teretes vel teretiusculæ; oculi minus lati; margo exterior loborum lateralium pronoti anguste elevatus, callosus; tuberculum prosternale altum; femora postica minus gracilia, lobis genicularibus sensim leviter angustatis; femora intermedia apicem coxarum posticarum attингentia; tibiæ anteriores minus breves; corpus minus fortiter compressum et elongatum.
- 6 (7). ♂♀. Corpus minus compressum; fastigium verticis carina longitudinali instructum; tempora fastigio dimidio breviora; area postcostalis elytrorum posterius haud ampliata; tuberculum prosternale apice ampliatum, truncatum; tibiæ posticæ extus spinis decem vel duodecim armatæ; articulus ultimus tarsorum longus; lamina subgenitalis marium sensim conico-acuminata, minus longa. — 2. *Tropidopola* STÅL, 1873.
- 7 (6). ♂♀. Corpus magis compressum; fastigium verticis carina destitutum; tempora ultra medium fastigii extensa; area postcostalis elytrorum marium posterius leviter ampliata; tuberculum prosternale compressum, apice haud ampliatum; tibiæ posticæ extus spinis quindecim vel septemdecim armatæ; articulus ultimus tarsorum brevis; lamina subgenitalis marium longe producta, compressa. — 3. *Metapa* STÅL, N. G.
- 8 (5). ♂♀. Antennæ ensiformes, depressæ; oculi latissimi; fastigium verticis carina destitutum; tempora longe versus apicem fastigii extensa; area postradialis versus medium elytrorum ampliata; tuberculum prosternale parvum, ad marginem anticum sterni positum; femora postica gracilia, lobis genicularibus angustis, ubique æque latis; pedes

anteriores breves; femora intermedia basin coxarum posticarum attingentia; tibiæ anteriores breves; articulus ultimus tarsorum brevis; lamina subgenitalis marium longissime producta, fortiter compressa. — 4. *Ischnacrida* STÅL, 1873.

- 9 (4). ♀. Caput ante oculos fortissime productum, pronoto plus duplo longius, parte producta capite reliquo circiter triplo longiore, antrorsum sensim angustata; tempora ultra medium fastigii extensa; costa frontalis inter basin et antennas fortissime compresso-elevata, laminata, ante antennas plana et sensim ampliata; oculi magni; antennæ lineares, gracilisculæ, fastigio capitis circiter tertia parte breviores; margo exterior lobi lateralium pronoti rectus, anguste elevatus; tuberculum prosternale fortiter compressum; pedes anteriores breviusculi; femora intermedia apicem coxarum posticarum subattingentia; femora postica gracilia, lobo geniculare exteriore longissimo; tibiæ posteriores extus spinis circiter quindecim armatae; tibiæ anteriores breviusculæ; articulus ultimus tarsorum breviusculus. — (Gen. 5.)
5. *Gonyacantha* STÅL, 1873.
- 10 (1). ♂♀. Antennæ ab oculis longe remotæ, ensiformes; caput ante oculos longissime productum; oculi quam in divisione præcedente minus longe descendentes; abdomen apicem femorum posticorum longe superans.
- 11 (16). ♀. Caput inter oculos pone fastigium sulco transverso magis minusve distincto instructum; fastigium planum vel planiusculum; pedes anteriores minus breves; femora intermedia basin coxarum posticarum superantia, apicem coxarum earundem plerumque attingentia; tibiæ anteriores minus breves; costa frontalis basin versus compressa et sulco destituta; valvulae genitales feminarum exsertæ. — (Gen. 6—8.)
- 12 (15). ♀. Vertex et fastigium carina longitudinali, interdum abbreviata, instructa; costa frontalis in parte circiter tertia vel quarta basali compressa, inter illam partem et apicem sensim ampliata et utrimque marginata; carinae laterales frontis distinctæ, versus antennas sensim obsoletiores vel evanescentes; tempora distincta vel subdistincta; sulcus transversus interocularis capitis subtilis; valvulae genitales feminarum formæ normalis.
- 13 (14). ♀. Carina fastigii verticis percurrens; margo exterior lobi lateralium pronoti totus rectus, margo anticus prope angulum sinuatus; tympana leviter immersa; tuberculum prosternale apice ampliatum, truncatum et retrorsum productum; lobi mesosternales contigui; lobi geniculares femorum posticorum sensim angustati, triangulares, leviter producti; tibiæ posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis circiter duodecim armatae. — 6. *Xenippa* STÅL, N. G.

- 14 (13). ♀. Carina fastigii verticis antrorsum sensim evanescens; margo exterior loborum lateralium pronoti in medio obtusissime angulatus, ante angulum obliquus, margo anticus usque ad angulum rectus; tympana fortius immersa; tuberculum prosternale breve, crassum, truncatum, apice haud ampliatum; lobi mesosternales levissime distantes; lobi geniculares femorum posticorum magni, exterior longissimus, foliaceus, longe ultra apicem femorum productus; tibiæ posticæ extus spinis novem vel decem armatae, spina apicali destitutæ. — 7. *Cervidia* STÅL, N. G.
- 15 (12). ♀. Caput superne carina destitutum; costa frontalis per maximam partem longitudinis vel inter basin et ocellum tectiformis, basi fortius compressa, ante ocellum apicem versus ampliata, marginibus obtusis; carinæ laterales frontis oblitteratae; tempora teretia, cum lateribus fastigii verticis confusa; sulcus transversus interocularis capitis fortiter impressus; dorsum pronoti horizontale; margo exterior loborum lateralium pronoti fere in medio obtusissime subangulati, fere recti, margo anticus totus rectus, angulus anticus obtusus; tympana leviter immersa; tuberculum prosternale apicem versus subampliatum, subtruncatum et posterius productum; tibiæ anteriores mediocres; lobi geniculares femorum posticorum mediocres, triangulares, apicem femorum haud attingentes; tibiæ posticæ in margine exteriore, praeter spinam apicalem, spinis tredecim vel quindecim armatae; valvulae genitales feminarum longæ, rectæ, inermes; cerci feminarum longæ, latæ, compressæ. — 8. *Carsula* STÅL, N. G.
- 16 (11). ♂♀. Caput superne carina longitudinali, ante oculos distinctissima, totum fastigium percurrente, pone oculos sensim evanescente, instructum, inter oculos sulco transverso destitutum; latera fastigii excavata; tempora distincta, plana, longe versus apicem fastigii extensa; costa frontalis planiuscula, basin versus sulcata, sulco usque ad basin continuato; carinæ laterales frontis distinctæ, ad scrobes antennarum incipientes, apicem frontis attingentes; margo exterior loborum lateralium pronoti sensim leviter sinuatus; tympana fortiter immersa; tuberculum prosternale compressiusculum, retrorsum nutans; pedes anteriores breves, tibiis brevibus instructi; femora intermedia basin coxarum posticarum attingentia; lobi geniculares femorum posticorum angusti, apicem versus vix angustati, apicem femorum attingentes; tibiæ posticæ in margine exteriore spina apicali destitutæ; cerci breviusculi, sensim angustati; lamina subgenitalis marium longissima, triquetra, compressa, superne carinata; valvulae genitales feminarum breves, apicem laminæ supraanalis longæ haud attingentes. — (Gen. 9.) 9. *Mesops* SERV.

ALCAMENES STÅL.

1. *A. granulatus* STÅL. — Viridis vel ferrugineo-flavescens; intervallo oculorum latiore; costa frontali basi sat fortiter compressa; oculis parvis, apud mares parti infraoculari genarum longitudine subæqualibus, apud feminas brevioribus; dorso pronoti basi apiceque in angulum acutum fortius producto, lobo postico lobo antico longiore, margine laterali sulcis transversis profundius inciso; maculis duabus interioribus elytrorum majoribus, longioribus, anteriore longe versus basin extensa; femoribus posticis extus in area media rugulis parvis subtilibus conspersis; tibiis posticis extus spinis duodecim vel tredecim armatis. ♂♀. Long. 29—46. Lat. pron. 8½—13 mill.

Tropinotus granulatus STÅL, Obs. orth. 1. p. 27. 1. (1875).

Patria: Uruguay, Monte Video. (Mus. Holm.)

2. *A. brevicollis* STÅL. — Praecedenti simillimus, differt corpore angustiore, costa frontali basi minus angustata, intervallo oculorum nonnihil angustiore, oculis majoribus, parte infraoculari genarum nonnihil longioribus, pronoti dorso antice posticeque minus producto, lobo postico lobo antico nonnihil breviore, marginibus lateralibus sulcis transversis leviter intersectis, maculis duabus interioribus elytrorum minoribus, rotundatis, anteriore posteriore minore et a basi remota, femoribus posticis nonnihil angustioribus et rugulis parvis sparsis destitutis, tibiis posticis extus spinis novem vel decem armatis. ♀. Long. 41, Lat. 9 mill.

Patria: Corrientes. (Mus. Holm.)

Variat virescens vel ochraceus et fusco-conspersus.

ANAUA STÅL.

1. *A. jissa* STÅL. — Obscure olivaceo-viridis; alis dilute rufescente-testaceis, hyalinis, parte circiter tertia apicali fusca; antennis, basi excepta, nigris, longis, gracilibus. ♂. Long. 34 mill.

♂. Lamina subgenitalis sat producta, sensim angustata, subtus transversim convexa, apicem versus sulcata, apice incisa; vena, quæ intervallum scalare areæ analis alarum intus terminat, in disco alæ sat incrassata.

Patria: Peru. (Mus. Holm.)

Frons, genae anterius et apice, pronotum et pleura dense fortiterque rugoso-punctata. Fastigium verticis leviter decline, transversum, apice truncatum. Costa frontalis plana, sulculos versus sensim leviter angustata. Pronotum dorso in lobo antico ruga longitudinali obsoleta, sulcis transversis interrupta, instructum, margine

antico in medio leviter prominulo et obtuse sinuato; lobo postico lobo antico nonnihil breviore, postice angulum sat obtusum formante. Elytra mutila in exemplo descripto. Alae apicem femorum posticorum nonnihil superantia. Tuberculum prosternale conicum, erectum. Tibiae posticæ extus spinis novem armatae.

PRIONACRIS STÅL.

1. *P. compressa* STÅL. — Flavescente-olivacea, subtus pilosa; elytris pellucidis, concoloribus, apicem versus dilutioribus, olivaceo-testaceo-venosis, venulis transversis hic illuc sordide albicantibus; alis in area radiali et parte adjacente areæ analis ultra medium elytris concoloribus, area anali præterea longe ultra medium rosea, parte rosea posterius leviter infuscata, parte circiter tertia apicali alarum vitrea, fusco-venosa. ♀. Long. 51 mill.

Patria: Nova Granada. (Coll. BRUNNER.)

Caput magnum, parte antica pronoti nonnihil latius. Intervallum oculorum latissimum, diametro longitudinali oculorum vix angustius. Fastigium verticis fortissime declive, anterius punctulatum et sulco longitudinali, in basin costæ frontalis continuato, instructum. Frons et genæ infra oculos distincte punctatae. Costa frontalis latissima, leviter elevata, ocellum versus sensim nonnihil angustata, ante ocellum angustior, obsoleta. Carinæ laterales frontis obtusissimæ. Oculi ovales, sat prominuli, parte infraoculari generum circiter dimidio longiores. Pronotum dense et sat fortiter punctatum, in lobo antico subrugosum, crista dorsali compressa, leviter elevata, in lobo antico incisuris tribus vel quattuor instructa, in lobo postico tuberculis circiter duodecim dentiformibus armata; lobus anticus brevis, margine antico angulum obtusum formante; lobus posticus lobo antico fere duplo longior, posterius in angulum acutum productus. Elytra ultra medium irregulariter et modice dense reticulata, pone medium inter venas longitudinales vena spuria unica et præterea venis transversis rectis remotis instructa; area postradialis lata, area interulnari multo latior. Alæ uti in Lophacri formatæ, vena autem, a qua intervallum scalare areæ analis intus terminatur, haud incrassata. Tuberculum prosternale teres, compressiusculum, obtusum. Antennæ et pedes postici desunt in exemplo descripto.

ANTIPHON STÅL.

1. *A. gallus* STÅL. — *A. acropyrino* PERTY (= *ornato* SAUSS) simillimus et maxime affinis, differt elytris nonnihil densius reticulatis, pronoto longiore, posterius fortius producto, crista summa lobi postici distincte erosula, macula subapicali areæ radialis alarum majore, macula apicali areæ analis minore, breviore, fortiter transversa, abdo-

minis dorso subsanguineo, fusco-cingulato, colore corporis pallidiore, flavescente-olivaceo, femoribus posticis concoloribus, tibiis tarsisque posticis testaceis, oculisque minoribus. ♂♀. Long. 34—61 mill.

Patria: Brasilia. (Coll. BRUNNER.)

ABILA STÅL.

1. *A. latipes* STÅL. — Lurida; elytris fuscis, pone medium dilutioribus, area anali pallide lurida; alis roseis, apicem versus leviter infuscatis, in parte exteriore fusco-venosis; femoribus posticis intus et subtus, nec non tibiis posticis superne glauco-fuscis, harum spinis dilute flavescentibus, apice nigris. ♀. Long. 50 mill.

Patria: Brasilia. (Coll. BRUNNER.)

Habitu puncturaque speciebus Phæopariæ similis, sed robustior. Caput lobo antico pronoti longitudine subæquale, punctulatum, punctis disci genarum in series confusas irregulariter curvatas dispositis. Vertex anterius cum fastigio leviter declivis, pone impressionem curvatam interocularem carina percurrente instructum, nigro-conpersum; fastigium transversum, sulco longitudinali instructum, postice ad suleum obtusissime obsoleteque subelevatum. Intervallum oculorum costa frontali duplo latius. Costa frontalis inter antennas leviter elevata, apicem versus oblitterata. Oculi parti infraoculari genarum longitudo subæquales. Pronotum dense distincteque punctatum, dorso parce nigro-conpersum, lobis lateralibus ad dorsum, præsertim posterius, infuscatis; lobo postico lobo antico tertia parte breviore, postice angulum obtusiusculum vel fere rectum formante. Elytra apicem femorum posticorum leviter superantia, pone medium sensim leviter angustata, apice angustiora et oblique subtruncata. Spina prosternalis sensim gracilescens. Femora postica dorso remote obsoleteque serrata. Tibiae posticæ extus spinis octo, præter spinam minutissimam apicalem, armatæ. Articulus primus tarsorum posticorum articulo tertio nonnihil longior. Antennæ lineares, in exemplo descripto partim mutilæ, infuscatae (an fortuito?) et annulis duobus pallidioribus ornatae.

ARISTIA STÅL.

1. *A. megacephala* BRUNN. — Capite majore, ubique multo subtilius punctato, fastigio breviore, distinete nonnihil declivi, carinis frontalibus acutioribus, costa frontali basi a latere visa arcuata, sulco costæ in apicem fastigii subcontinuato, pronoto subtilius punctato, dorso tereti, in lobos laterales sensim continuato, carina media subtili instructo, basi emarginato-subtruncato, lobo postico pronoti breviore, elytris rudimentariis, distantibus, apicem segmenti mediani attingentibus, angustis, extus pone medium leviter ampliatis, an-

tennis gracilioribus, nonnihil longioribus, oculis nonnihil latioribus et convexioribus, lamina supraanal nonnihil latiore ab *A. mordace* diversa. ♂. Long. 23 mill.

Pezotettix megacephala *BRUNN., Verh. z.-b. Ges. Wien. 11. p. 226. (1861.)

Patria: Venezuela. (Coll. BRUNNER.)

Lamina subgenitalis leviter producta, sensim angustata, apice anguste rotundata, subtus convexa, illi *A. mordaci* verisimiliter similis.

PHÆOPARIA STÅL.

a. Antennæ anguste subensiformes; ocelli magni; elytra maculis fuscis vel nigris destituta, pone medium linea, hic illic interrupta, oblique transversa, albicante notata, parte circiter tertia apicali nonnisi apice retrorsum angustata, apice oblique truncata vel sinuato-truncata, angulo apicali exteriore acuto, margine costali antice distincte sinuato; venæ transversæ partis posterioris elytrorum utriusque serus cum venis longitudinalibus angulos rectos vel subrectos et areolas longiores quam latiores formantes; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi maris unici cogniti lobis duabus latis, brevibus, minus distantibus, instructus; spinae tibiarum posticarum fuscae.

1. *P. linea* alba L., STÅL, Rec. Orth. 1. p. 57. 1. (1873.)

2. *P. castanea* BRUNN. — *Opomala castanea* *BRUNN., Verh. z.-b. Ges. Wien. 11. p. 225. (1861.)

Patria: Paramaribo. (Coll. BRUNNER.)

♂. Lamina supraanal nonnihil longior quam latior, ultra medium sensim leviter angustata, dein subito utrimque angulum subprominulum formans, pone angulos sinuata, apice anguste producta.

aa. Antennæ graciliores, lineares vel sublineares; ocelli minores, haud tamen parvi; elytra maculis fuscis vel nigris in disco plerumque ornata, pone medium linea obliqua albicanti nulla vel obsoletissima notata, margine costali antice haud vel levissime sinuato; venæ transversæ partis posterioris elytrorum apud feminas obliquæ et irregulariter dispositæ; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi marium cognitorum dentibus vel spinis duabus fortiter distantibus armatus; spinae tibiarum posticarum pallidæ, apice fuscae.

b. Fastigium leviter vel levissime declive.

c. Articuli apicales palporum maxillarium distinctissime compressi et nonnihil ampliati; antennæ longiores.

3. *P. annulicornis* STÅL, Rec. orth. 1. p. 57 2. (1873.)

Patria: Nova Granada. (Mus. Holm.)

4. *P. rotundata* STÅL. — Ferrugineo-flavescens; antennis, articulis quinque vel sex basalibus exceptis, genis, vitta angusta inaequali loborum lateralium pronoti ad dorsum posita, limbo lateralí mesosterni et metasterni, macula coxarum posteriorum, nec non heme-

lytris fuscis, horum area anali ferrugineo-flavescente; elytris apice rotundatis. ♂. Long. 22 mill.

♂. Margo apicalis segmenti dorsalis ultimi in medio leviter emarginatus, dentibus quattuor, duobus majoribus maxime distantibus duobusque obtusis parvis, obsoletis, minus distantibus, armatus; lamina supraanalis vix longior quam basi latior, a basi nonnihil ultra medium lateribus parallelis instructa, dein subito fortissime angustata et posterius in lobum angustum producta; anguli laterales laminæ supraanalis, qui ante partem apicalem angustam exstant, oblique sinuato-truncati; cerci sensim angustati, apice incurvi; lamina subgenitalis nonnihil producta, sensim nonnihil angustata, apice rotundata, subitus leviter convexa.

Patria: Chiriqui. (Coll. BRUNNER.)

P. annulicornis maxime affinis, differt antennis nonnihil crassioribus et longioribus, pone medium australis pallidis destitutis, elytris alisque brevioribus, tantum ad partem tertiam apicalem femorum posticorum extensis, illis apice rotundatis, obscurioribus, maculis fusciscentibus destitutis, bis vinaceis, area radiali apice rotundata, nec non forma laminæ supraanalis, cuius anguli laterales in dentem acutum haud prominent.

cc. *Articuli apicales palporum maxillarium haud nisi levissime compressi, haud ampliati; antennæ breviores.*

5. *P. maculipennis* STÅL. — Fusca vel ochracea, capite thorace que dense punctatis; dorso pronoti, praesertim anterius, granulis parvis obscurioribus consperso; elytris fusco-nebulosis et ante medium maculis duabus vel tribus obscure fuscis vel nigricantibus, nitidulis, anteriore vel duabus anterioribus obscurioribus et reticulo destitutis, laevigatis; alis dilute cinnabarinis, harum area radiali elytrisque apice truncatis, apicem femorum posticorum vix superantibus; limbo laterali sternorum, coxis posterioribus subtus, femoribus posticis subtus et intus, maculis parvis carinarum femorum posticorum nec non antennis apicem versus nigro-fuscis. ♀. Long. 36 mill.

Patria: Nova Granada. (Mus. Holm.)

P. annulicorni maxime affinis, sed major, forma palporum, antennis brevioribus, capite pronotoque simul sumtis longitudine æqualibus, elytris alisque nonnihil brevioribus, maculis elytrorum multo obscurioribus, anteriore laevigata, forte etiam forma partium analium maris adhuc ignoti, distincta. Lobi mesosternales, uti in *P. annulicorni*, distinctissime transversi.

Species affinis, clytris alisque fortiter abbreviatis, adest in collectione Brunneri.

bb. *Fastigium verticis fortissime, subperpendiculariter declive; elytra fortiter abbreviata, angusta, ultra medium sensim leviter ampliata, haud valvantia; aëre rutilmentariae; articuli apicales palporum maxillarium leviter compressi, haud vel vix ampliati.*

6. *P. obtusa* STÅL. — Ochracea; genis, vitta loborum laterali pronoti ad dorsum, vitta media elytrorum femoribusque posticis intus fuscis; maculis duabus elytrorum laevigatis, subnitidis, nigris,

una minore media, altera majore posteriore; femoribus posticis subtus, tibiis posticis tarsisque rufo-testaceis; femoribus posticis apicem versus, tibiis posticis basin versus infuscatis. ♂. Long. 22 mill.

♂. Margo posticus segmenti dorsalis ultimi abdominis in medio obtusissime sinuatus, ad sinum utrimque dente armatus; lamina supranaulis nonnihil longior quam latior, anterius sulco longitudinali instructa, marginibus lateralibus ultra medium parallelis, reflexis et posterius dente parvo lato instructis, prædicta, dein postice subito maxime angustata et apice in processum angustum, brevem, sensim subangustatum, apice obtusum prominula; cerci compressi, curvati, a latere visi ultra medium sensim angustati, apice oblique angustati; lamina subgenitalis levissime producta, sensim nonnihil angustata, apice latiuscule truncata.

Patria: Peru. (Mus. Holm.)

Congenericis habitu sculpturaque simillima, sed fastigio ante oculos subito fortiter declivi, elytrisque fortiter abbreviatis, segmentum medianum nonnihil superantibus facile distinguenda. Antennæ exempli descripti magna parte mutilæ, fuscæ, basi ochraceæ. Lobus posticus pronoti brevis, angulum obtusum integrum formans. Elytra ante medium contigua vel subcontigua. Alæ parvæ.

7. *P. emarginata* STÅL. — Viridis; antennis, basi excepta, maculaque posteriore læviuscula nitida elytrorum nigris; femoribus posticis apice incarnatis; tibiis tarsisque posticis rufescensibus, illarum spinis apice nigris. ♀. Long. 34 mill.

Patria: Puerto Cabello Venezuela. (Mus. Holm.)

P. obtusa maxime affinis, lobo postico pronoti postice obtuse rotundato et in medio angulatim emarginato, elytris angustioribus et latiuscule distantibus, divergens. Alæ minutissimæ.

CORYPHISTES CHARP.

a. *Femora postica crassiora, leviter vel minus fortiter compressa, lobis genicularibus triangularibus, longitudine æqualibus vel subæqualibus, apicem femorum haud superantibus.*

b. *Fastigium verticis longius quam basi latius; femora postica modice crassa, angulis genicularibus triangularibus vel dentiformibus; elytra longa.*

1. *C. cyanopterus* CHARP.

bb. *Fastigium verticis æque longum ac basi latum; fastigium cum parte basali costæ frontalis minus productum quam in divisione præcedente; femora postica crassa vel crassiuscula, angulis genicularibus obtusis, plerumque rotundatis; elytra minus longa.*

2. *C. nigrinervis* STÅL. — Pallide olivaceus, fronte, pronoto, pleuris pedibusque nigro-conspersis; vitta verticis lineaque lateralí postoculari obliqua fusco-ferrugineis; elytrorum reticulo nigro-macu-

lato, venis longitudinalibus nigris et posterius nigromarginatis; alis leviter infuscatis, fusco-venosis; femoribus posticis intus tibiis tarsisque posticis subsanguineis, tibiarum spinis apice nigris. ♂. Long. 45 mill.

♂. Margo apicalis segmenti dorsalis ultimi in medio sat late rectus et incisura instructus; lamina supraanalisis —? cerci leviter compressi, sensim leviter angustati, apice leviter decurvi; lamina subgenitalis sensim angustata, subacuminata, nonnihil producta.

Patria: Peak Downs Australiae. (Mus. Holm.)

Caput lœvigatum. Margines laterales costæ frontalis distincte elevati. Fastigium triangulare, horizontale, apice leviter sulcatum, marginibus lateralibus anterius levissime sinuatis, angulo apicali acuto. Pronotum lœvigatum, in lobo postico punctulatum; dorsum lobi antici sulcis transversis obsoletis præeditum, in medio laterum inter sulcos tuberculo obtuso minus distincto instructum; lobus posticus lobo antico nonnihil altior; carina dorsalis maxima parte oblitterata, tantum antice rugæ instar elevata, postice quoque cum parte adjacente marginis basalis obtuse elevata. Elytra apicem abdominis leviter superantia. Femora postica sat crassa, in marginibus dorsali et inferiore nec non in carina superiore lateris exterioris remote distincte serrata. Antennæ anguste ensiformes, capite pronotoque unitis multo longiores.

3. *C. nutans* STÅL. — Pallide griseo-flavescens, maculis minutis remotis et inæqualibus nigris conspersus, vertice minutissime consperso, maculis duabus disci nonnihil majoribus; elytris maculis parvis, in area radiali majoribus et elongatis, conspersis; alis sordide subvinaceo-hyalinis, apice parce fusco-conspersis; femoribus tibiisque posticis intus carneis. ♀. Long. 52 mill.

Patria: Rockhampton. (Mus. Holm.)

A præcedente, cui sat affinis, differt fastigio distinctissime declivi et marginibus lateralibus totis rectis instructo; marginibus costæ frontalis obtusioribus et tantum in disco frontis elevatis; antennis angustissime ensiformibus et nonnihil brevioribus; pronoto basi obtusissimo, intra marginem anticum et in lobo postico distinctius puu-ctulato, carina longitudinali obtusissima, prope apicem vix elevatiore, basi haud elevata, instructo; lobo postico pronoti quam lobo antico haud altiore, margine ipso basali in medio leviter incrassato; elytris alisque brevioribus, apicem femorum posticorum leviter superantibus, apicem abdominis haud attingentibus; femoribus posticis minus crassis, magis compressis, tantum in carina dorsali, licet multo obsoletius et remotius, serratis; præterea corpore pedibusque minutius et magis inæqualiter nigro-conspersis, lateribus pronoti nigro-marmoratis, elytris alio modo pictis; oculis quoque, uti videtur, majoribus.

aa. *Femora postica graciliuscula, sat compressa, lobo geniculari interiore foliaceo, fortiter producto, apicem femorum superante.*

4. *C. validicornis* STÅL. — Ferrugineus, vittis duabus genarum, in latera frontis continuatis, vitta angusta verticis pone fastigium, vittis quinque angustis pronoti nigris; elytris lurido-pellucidis, ma-

culis parvis ferrugineis remote conspersis; alis leviter infuscatis, fusco-venosis, in area anali basin versus leviter cæruleoscentibus; femoribus, tibiis tarsisque posticis carneis, illis extus fuscis, in area media albidis et nigro-carinatis, intus in apice obscure violaceis, lobo geniculare interiore albicante; pedibus anticis ferrugineo-olivaceis. ♀. Long. 63 mill.

Patria: Peak Downs. (Mus. Holm.)

A congenericis mihi cognitis reliquis antennis late ensiformibus, extus leviter serratis, fastigio capitis majore et alio modo formato, femoribus posticis gracilioribus et compressioribus et ceteris distinctissimus. Fastigium fere dimidium longitudinis verticis efficiens, nonnihil longius quam basi latius, sensim angustatum, apice rotundatum et transversim excavatum, posterius carina subtili obtusa, per verticem continuata, instructum, marginibus lateralibus in medio bisinuatis, posterius rotundatis. Antennæ capite pronotoque unitis nonnihil longiores, femoribus posticis nonnihil breviores. Caput laevigatum, fronte apice genisque granulis parvis remotissime conspersis. Pronotum granulis parvis remote conspersum, ad marginem anticum et in lobo postico sat dense punctulatum; sulci transversi sat distincti; carina dorsalis partim oblitterata, tantum in apice et in lobo postico distinguenda; margo basalis obtusissime rotundato-subangulatus; lobus posticus lobo antico haud altior. Mesopleura et metapleura punctata et remote granulata. Elytra et alae apicem abdominis nonnihil superantia. Femora postica in marginibus dorsali et inferiore, nec non in carinis lateris exterioris remote serrata. Tuberculum prosternale obtusissimum. Lobus genicularis exterior femorum posticorum longior et angustior quam in congenericis.

VILERNA STÅL.

1. *V. rugulosa* STÅL. — *V. æneo-oculatæ* DE GEER simillima et maxime affinis, differt colore corporis obscuriore, costa frontali et intervallo oculorum nonnihil latioribus, fastigio verticis nonnihil majore, pronoto distinctius ruguloso et ad margines anticum et posticum granulis rugulisque distinctissimis nigricantibus consperso, elytris aliquo brevioribus, apicem femorum posticorum attingentibus, nec non area anali elytrorum haud pallescente. ♂♀. Long. 20—28 mill.

Patria: Peru (Mus. Holm.) Rio Janeiro. (Coll. BRUNNER.)

NUCERIA STÅL.

1. *N. roseipennis* STÅL. — Olivaceo-flavescens; temporibus pone oculos et lateribus verticis conjunctim virescentibus; antennis linearibus, fuscis; pronoto olivaceo-testaceo, vitta marginali loborum late-

valium, in mesopleura continuata, sordide flavescente; elytris dilute olivaceo-virescentibus, area anali pallide testaceo-flavescente; alis sordide hyalinis, olivaceo-fusco-venosis, area anali ultra medium rosea.
 ♀. Long. 48 mill.

Patria: Brasilia. (Coll. BRUNNER.)

Quoad habitum et picturam laterum pronoti et elytrorum *Vilernæ æneo-oculatae* haud dissimilis. Caput maxima parte lævigatum, fronte ante medium leviter rugosa; fastigio leviter declivi, triangulari, nonnihil latiore quam longiore. Antennæ capiti pronotoque longitudine subæquales. Pronotum totum sat fortiter rugulosum, in lobo postico rugoso-punctatum, dorso carina obtusa percurrente distinete elevata, sulcis transversis distinete intersecta, instructum, lobo antico lobo postico nonnihil longiore, margine antico obtuse angulato, lobo postico posterius angulum obtusum formante. Elytra apicem femorum posticorum nonnihil superantia, ultra medium sat dense irregulariterque reticulata, pone partem fere tertiam basalem apicem versus sensim angustata, apice angustiuscula et rotundata, margine costali ante medium sensim rotundato. Tuberculum prosternale sat longum, compressum, obtusum. Margo dorsalis femorum posticorum remote, obtuse obsoleteque serratus. Tibiae postice extus spinis octo armatae.

GONIÆA STÅL.

a. *Costa frontalis marginibus partim parallelis instructa, parte anteriore tantum apicem versus sensim distinctius ampliata; tuberculum prosternale apice ab antico posticoque compressum, simuatum vel sinuato-truncatum et interdum ampliatum; dorsum pronoti cristatum vel tectiforme.*

b. *Pronotum carina distinete elevata et subcompressa instructum vel cristatum, lobo postico lobo antico longiore et posterius angulum acutum formante; tuberculum prosternale ab antico visum usque ad apicem sensim angustatum.*

1. *G. Australasiae* LEACH. = *Tropinotus cinnamomeus* SERV.

2. *G. maculicornis* STÅL. — *G. Australasiae* magnitudine, forma partium plurimarum, sculptura et colore simillima, differt fastigio verticis nonnihil breviore, fronte genisque rugulosis, haud granulatis, pronoto cristæ arcuataæ loco carina ubique æqualiter elevata, subcompressa, instructo, antice posticeque minus fortiter angulatim produeto, angulo antico obtuso, angulo postico subaeuto, area anali alarum basin versus leviter roseo-induta, antennis iutus nigro-maculatis, parte basali compressa costæ frontalis nonnihil breviore, femoribus posticis angustioribus, spinis tibiarum posticarum totis vel basi obsecurioribus, oculisque majoribus. ♂♀. Long. 31—48 mill.

Patria: Queensland. (Mus. Holm.) Rockhampton. (Coll. BRUNNER.)

bb. *Pronotum crista vel carina subcompressa destitutum, lobo antico lobo postico breviore vel subbreviore, angulo, quem format margo anticus, obtuso et rotundato, lobo postico posterius angulum obtusum, apice rotundatum, formante; tuberculum prosternale ab antico visum apicem versus haud angustatum, a medio vel fere a basi ad apicem ubique aequa latum vel subampliatum, apice late sinuatum.*

c. *Pronotum carina distincta laevigata instructum; vertex carina percurrente, laevigata et sat distincta præditum.*

3. *G. ensicornis* STÅL. — *G. rugulosæ* maxime affinis, differt magnitudine majore, antennis distinctius ensiformibus, vertice carina percurrente instructo, pronoto carina laevigata, nitida, laevissime elevata, obtusa, apud feminam in lobo antico et parte anteriore lobi postici subtilissime subsulcata, instructo, femoribus posticis proportionaliter nonnihil angustioribus, intus sanguineis. ♂♀. Long. 29—46 mill.

Patria: Cap York Australiæ. (Coll. BRUNNER.)

Antennæ maris basin versus angustiores quam in femina et angustissime ensiformes. Elytra apicem abdominis superantia. Tibiae posticæ variant intus glauco-cærulescentes vel violaceo-sanguineæ. Lamina sapraanalis et cerci maris longiores quam in *G. Australasiæ*.

4. *G. carinata* STÅL. — Praecedenti maxime affinis, differt antennis obsoletius ensiformibus, carina verticis et pronoti distinctiore, elytris apicem abdominis subbattingentibus, femoribus posticis brevioribus et nonnihil latioribus, uti in *G. Australasiæ* formatis, spinis tibiarum posticarum obscurioribus, in uno latere, uti videtur, totis nigris, tuberculoque prosternali apice latiore et subampliato. ♀. Long. 53 mill.

Patria: Gayndah Australiæ. (Mus. Holm.)

cc. *Pronotum obtuse tectiforme, carina laevigata nitidiore destitutum; carina verticis obsoletissima.*

5. *G. rugulosa* STÅL, Rec. Orth. 1. p. 56. 1. (1873.)

Patria: Australia. (Mus. Holm.)

aa. *Costa frontalis per totam longitudinem basin versus sensim angustata; tuberculum prosternale totum teres vel apice obsoletius compressum, ibidem haud sinuatum.*

d. *Dorsum pronoti teres vel teretiusculum, a lobis lateralibus carina haud discretum.*

6. *G. limbata* STÅL. — Olivaceo-ferruginea, subtus pallescens; elytris griseo-hyalinis, maculis parvis subannuliformibus conspersis; alis vinaceis, posterius fusco-limbatis, area radiali fusco-venosa; femoribus posticis griseis vel ferrugineo-griseis, carinis lateris exterioris nigro-maculatis, latere interiore sanguineo; tibiis tarsisque posticis stramineis, illarum latere interiore sanguineo, spinis apice nigris. ♂♀.

♂. Minor, gracilior, antennis femoribus posticis longioribus, lobis metasternalibus subcontiguis. Long. 30 mill.

♀. Major, minus gracilis; antennis femoribus posticis nonnihil brevioribus, lobis mesosternalis magis distantibus. Long. 55 mill.

Patria: Queensland. (Mus. Holm.) Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

Species insignis, pictura alarum, forma costæ frontalis et femorum posticorum a congenericis reliquis divergens. Vertex carina percurrente instructus. Frons granulis parvis obsoletis remotissime conspersa, prope apicem rugulis tribus parvis oblongis distinctioribus, una longiore in costa posita, instructa; carinæ frontales summæ pallecentes, laterales obscurius limbatæ. Antennæ lineares. Pronotum anterius et in lobo postico dense ruguloso-punctatum, præterea remote subgranulatum, dorso teres, carina obtusa percurrente instructum, margine antico angulum obtusum rotundatum formante, lobo postico lobo antico paullo breviore, posterius obtuse rotundato-subangulato. Elytra apicem femorum lounge superantia, pone medium sensim angustata, apice rotundata, margine costali anterius sensim leviter rotundata. Femora postica sat compressa, subtus pone partem tertiam basalem magis ampliata quam in congenericis reliquis. Tuberculum prosternale apice truncatum vel subtruncatum.

7. *G. fuscula* STÅL. — *G. limbata* simillima et maxime affinis, differt colore multo obscuriore, carinis frontalibus fusco-maculatis, quod tamen forte variat, præsertim autem anteunis brevioribus, apud marem quam femoribus posticis nonnihil brevioribus, alisque virecente-infuscatis, fusco-venosis. ♂. Long. 28 mill.

Patria: Sydney. (Mus. Holm.)

dd. *Dorsum pronoti planum, in marginibus lateralibus carinatum.*

8. *G. plana* STÅL. — Fusco-cinerascens, parce minuteque, in pectore ventreque densius nigro-conspersa; costa frontali nigra, marginibus albicantibus; alarum area anali fulvescente, apice et intus leviter infuscata, area radiali infuscata, fusco-venosa; femoribus posticis intus nigro-fuscis; tibiis posticis superne intus fuscescente-violacecentibus, spinis interioribus totis vel fere totis nigris; vitta verticis, dorso pronoti areaque anali elytrorum pallescentibus, elytris basi vitta brevissima nigricante; antennis flavescente-albidis. ♀. Long. 39 mill.

Patria: Australia, Peak Downs. (Mus. Holm.)

Species maxime insignis, forma pronoti a congenericis divergens. Genæ apicem versus et frons remote rugulosæ. Vertex carina destitutus; intervallum oculorum nonnihil angustius quam in congenericis. Pronotum præsertim in lobis lateralibus rugulosum; dorso in lobo antico granulis nonnullis obsoletis conspersum et anterius punctulatum, in lobo postico parce granulato-subrugosum, posterius punctulatum; dorsum planum, autice angustissimum, hinc retrorsum sensim ampliatum, carina media subtili et obtusa instructum, marginibus lateralibus carina obtusa subtili, autice posticeque obsoletiore, instructis; lobus posticus lobo antico vix longior, postice angulum obtusum, apice rotundatum et submarginatum, formans, lobus anticus apice obtuse rotundato-prominulus. Elytra apicem abdominis superantia, apice oblique truncata. Tuberculum prosternale cylindricum, apice convexum. Antennæ lineares, femoribus posticis dimidio breviiores.

STROPIS STÅL.

a. *Carina dorsalis pronoti subtilis, levissime elevata; sulci transversi prōnoti paralleli.*

b. *Pronotum basi obtuse productum, rotundatum vel subangulatum; elytra latitudine normalia, contigua vel valvantia.*

c. *Elytra alaeque completa, apicem abdominis attingentia vel leviter superantia.*

d. *Frons lavigata, haud rugosa.*

1. *S. maculosa* STÅL. — *Acridium (Stropis) maculosum* STÅL.
Rec. orth. 1. p. 69. 22 (1873).

Patria: Australia. (Mus. Holm.)

dd. *Frons parce et magis minusve distincte rugosa.*

e. *Pronotum rugosum, in lobo postico præterea magis minusve distincte punctatum.*

f. *Pronotum in lobo antico obsolete rugosum, inter dorsum et lobos laterales ruga subtili destitutum.*

2. *S. rufipes* STÅL. — *Fuscescens vel ferrugineo-fuscescens, subitus cum capite femoribusque posticis pallidior; alis sordide hyalinis, fusco-cinnabarinis, subitus cinnabarinis; tibiis posticis cinnabarinis, spinis apice nigris; tarsis posticis fusco-violaceis.* ♂♀.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice in medio bidentatum; cerci breves, nonnihil longiores quam latiores, sensim leviter angustati, apice nigri, truncati; lobi metasternales contigui. Long. 20 mill.

♀. Lobi metasternales nonnihil distantes. Long. 33 mill.

Patria: Sydney. (Coll. BRUNNER.)

Statura formaque pronoti *G. rugulosa* sat similis, sed antennis elytrisque nonnihil brevioribus, forma costæ frontalis, femoribus posticis latioribus, pronoti dorso teretiusculo, sculptura pronoti et ceteris facile distinguenda. Genæ apicem versus et frons rugulis parvis remote conspersæ. Costa frontalis ante ocellum apicem versus sensim nonnihil ampliata, inter ocellum et antennas lateribus subparallelis instructa et ibidem latior quam in *G. rugulosa*. Carinæ frontales interdum fuseo-maculatae. Vertex pone fastigium obsolete carinatus. Margo cariniformis fastigii postice furcatus. Autennæ lineares, capite pronotoque vix longiores (♂) vel nonnihil breviores (♀). Pronotum remote rugulosum, in lobo postico punctatum et rugulis longitudinalibus lavigatis distinctioribus conspersum, dorso teres, carina obtusa leviter elevata instructum; margo anticus prouoti obtuse rotundatus; lobe posticus posterius obtuse rotundato-angulatus, lobe antico paullo brevior.

ff. *Pronotum fortius rugosum, inter dorsum et lobos laterales ruga subtili continua vel interrupta instructum.*

3. *S. pictipes* STÅL. — Pallide sordide flavescens, dorso in cinnamomeum vergens; lobis lateralibus pronoti ad dorsum nigri-

cantibus; elytris cinnamomeo-pellucidis, obscurius venosis; alis fulvescentibus; dorso abdominis, femoribus posticis intus, tibiis tarsisque posticis subcinnabarinis; femoribus posticis extus superne fasciis tribus, intermedia latissima, nigricantibus ornatis. ♂. Long. 25 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice in medio dentibus duobus nigris instructum; lamina supraanalis triangularis, ante medium carinis duabus distantibus concoloribus, ante medium præterea carina transversa nigra, fortius elevata, medio interrupta, instructa, marginibus lateralibus posterius leviter sinuatis; cerci breviusculi, compressi, obtusi, lamina subgenitalis brevis, obtusa; lobi metasternales levissime distantes.

Patria: Australia, Peak Downs. (Mus. Holm.)

Caput maxima parte lævigatum, genis apicem versus fronteque rugulis obtusissime elevatis rarissimis conspersis. Fastigium verticis distincte nonnihil declive. Costa frontalis ante medium apicem versus sensim leviter ampliata, inter medium et antennas lateribus parallelis instructa, basi leviter angustata. Pronotum parce rugulosum, in lobo postico punctulatum, inter dorsum et lobos laterales ruga subtili, pluries interrupta, instructum, his rugis obsoletis, ante medium lobi antici antrorum subdivergentibus, pone medium lobi ejusdem sensim distinctius divergentibus. Tuberculum prosternale teres, obtusum. Lobi mesosternales sat divergentes, leviter transversi. Antennæ sat longæ, femoribus posticis haud multo breviores.

ee. Pronotum in lobo postico punctulatum, in lobo antico dorso laeviusculum vel obsolete rugulosum, in lobis lateralibus rugoso-reticulatum; vittæ duæ, per verticem, pronotum et elytra extensæ, ferrugineo-flavescentes.

4. *S. tricarinata* STÅL. — Fuscescente-lurida; antennis fuscis; elytris fuscescentibus, apicem versus pallidioribus; vittis duabas, per verticem, latera dorsi pronoti et aream analem elytrorum extensis, ferrugineo-flavescens, intervallo vittarum nigricante; tibiis posticis subviolaceo-testaceis, spinis pallidis, apice nigris; carinis lateris exterioris femorum posticorum fusco-maculatis; alis dilute fulvescentibus; pronoto carina media distinctissima et, inter dorsum et lobos laterales, carina recta distincta, in lobo postico obsoletiore, instructo, dorso in lobo antico laeviusculo. ♀. Long. 31 mill.

Patria: Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

5. *S. bivittata* STÅL. — Præcedenti simillima, ab illa magnitudine majore, pronoto densius punctato et rugoso-reticulato, inter dorsum et lobos laterales carina destituto, dorso in lobi antici lateralibus rugoso-reticulato, carina superiore lateris exterioris femorum posticorum fusca divergens. ♀. Long. 40 mill.

Patria: Australia, Gayndah. (Mus. Holm.)

ee. Elytra et alæ abbreviata, pone segmentum primum abdominis vix extensa.

6. *S. rugifrons* STÅL. — Olivaceo-flavescens; elytris ad aream analem pallescentem linea fusca notatis; disco interiore maculisque

carinæ discoidalis superioris lateris exterioris femorum posticorum, nec non parte brevi basali interiore apiceque spinarum tibiarum posticarum fuscis. ♀. Long. 43 mill.

Patria: Victoria. (Coll. BRUNNER.)

Forma elytrorum abbreviatorum, pronoti femorumque posticorum a congeneris reliquis divergens. Caput, præsertim in fronte, rugosum. Costa frontalis pone ocellum latior quam in plurimis congenericis, inter ocellum et antennas lateribus parallelis instruta. Vertex carina obtusa, in fastigio obsoleta, instructus. Pronotum sat fortiter irregulariterque rugosum, in lobo postico punctatum et posterius rugis nonnullis longitudinalibus, marginem basalem attingentibus, instructum; dorso teres, carina obtusa nitida instructum, marginibus antico et postico obtuse rotundatis, hoc utrimque leviter sinuato; lobo postico lobo antico nonnihil breviore. Elytra pronoto longitudine subæqualia, extus fortiter rotundata, pone medium sensim oblique rotundato-angustata, vix dimidio longiora quam latiora. Alæ vinaceæ. Femora postica minus compressa, et area dorsali exteriore quam in congenericis latiore instructa. Antennæ lineares, pronoto longitudine subæquales.

bb. *Pronotum abbreviatum, basi subemarginato-truncatum; elytra rudimentaria, angusta, fortiter distantia, pone segmentum medianum vix extensa, a basi ultra medium sensim leviter ampliata, extus leviter rotundata, margine interiore fere toto recto.*

7. *S. reticulata* STÅL. — Flavescente-cinamomea; lobis lateribus pronoti ad dorsum vitta fuscescente notatis; elytris rudimentariis; disco interiore maculisque carinæ discoidalis inferioris lateris exterioris femorum posticorum nec non tibiis posticis basi intus nigro-fuscis. ♀. Long. 31 mill.

Patria: Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

Caput quam in congenericis præcedentibus fortius densiusque, et quoque in vertice rugosum. Carinæ frontales nigro-conspersæ. Anteunæ lineares, capite pronotoque longitudine subæquales. Pronotum irregulariter et minus dense distinctissimeque rugosum, in lobo postico quoque remote punctulatum, carina subtili percurrente dorsali instructum, rugis in dorso lobi antici longitudinalibus, undulatis, rugis illis, quibus dorsum lobi hujus a lobis lateralibus separatur, distinctioribus, a medio lobi antrorum et retrorsum sensim leviter divergentibus; margine antico obtusissime rotundato; lobo postico fortiter abbreviato, basi obtuse sinuato. Elytra oblonga, circiter triplo longiora quam latiora, pone segmentum medianum leviter extensa, fortiter distantia. Metanotum et segmentum medianum longitrusum rugosa. Tuberculum prosternale ab antico posticoque leviter compressum, subtriangulare. Lobi mesosternales transversi. Intervallum lborum mesosternalium transversum, lobis latitudine subæquale. Lobi metasternales distantes. Femora postica lata, margine dorsali remotissime obtusissimeque serrato. Propter formam elytrorum speciebus *Cratippi* subsimilis, sed multo angustior. Color verisimiliter variabilis, tibiis posticis in vivis forte rufescentibus.

8. *S. limbata* STÅL. — *S. reticulatae* simillima et maxime affinis, differt magnitudine minore, capite pronotoque minus fortiter rugosis, vertice cum fastigio laevigato, capite tumidiore, carinis frontis obtusioribus; pronoto inter dorsum et latera lobi antici ruga subtilliore et multo obsoletiore instruetum, margine inferiore femorum posticorum distincte rotundato, subampliato, femoribus posticis superne fusco-trimaculatis, tibiis posticis fulvescentibus, tuberculo prosternali latius triangulari, elytris margine interiore venaque adiacente flavescente-albicantibus, vena illa fortiore. ♀. Long. 26 mill.

Patria: Australia, Peak Downs. (Mus. Holm.)

9. *S. vermiculata* STÅL. — Praecedentibus duabus, et, propter verticem rugulosum, carinas frontales distinctiores, caput haud tumescens, colorem elytrorum formamque femorum posticorum, *S. reticulatae* praesertim affinis, distinctissima autem pronoto distincte subvermiculato-rugoso, inter dorsum et lobos laterales ruga destituto, tuberculo prosternali basi angustiore, apice angustato, vix vel minus distincte triangulari, femoribus intus, saltem apice, nigris, tibiis posticis pone medium intus et superne subsanguineis, ante medium intus nigris, annuloque pallido ornatis. ♀. Long. 34 mill.

Patria: Rockhampton Australiae. (Mus. Holm.)

aa. *Carina dorsalis pronoti fortius elevata, in lobo antico cristam humilem posterius interruptam formans; sulci transversi lobi antici pronoti in medio dorsi, ubi interrupta est crista, appropinquati.*

10. *S. cristulata* STÅL. — Varicolor, cinerascens, vertice dorsoque pronoti late nigro-vittatis, vel ferrugineo-grisescens, fusco-conspersa; capite pronotoque rugulis fortiter elevatis conspersis; elytris griseo-pellucidis, venis obscurioribus, fusco-lineolatis; alis pallidissime cæruleoscentibus, in area radiali subinfuscatis et fusco-venosis; tuberculum prosternale cylindricum; intervallo loborum mesosternalium lobis angustiore; carina dorsali et carina superiore lateris exterioris femorum posticorum denticulatis; antennis mediocribus. ♀. Long. 43 mill.

Patria: Australia, Gayndah. (Mus. Holm.)

ANTHERMUS STÅL.

1. *A. granosus* STÅL. — Dilute olivaceo-virescens, parce pilosus; elytris apicem versus subdecoloribus et hyalinis, areis costali et anali leviter subsanguineo-indutis; alis ante medium roseis, pone medium decoloribus; apice tibiarum posticarum articulisque basalibus tarsorum posticorum subsanguineis. ♂. Long. 19 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim obtuse emarginatum; lamina supraanal is longior quam latior, a basi ad medium lateribus parallelis instrueta, deinde apicem versus sensim rotundato-angustata, apice subacuminata, soleo longitudinali instructa; cerci

sat longi, teretes, sensim gracilescentes, apiee fureati; lamina subgenitalis nonnihil producta, sensim angustata.

Patria: Port Natal. (Coll. BRUNNER.)

Habitu et forma partium plurimarum, structuraque sternorum speciebus typicis *Catantopis* simillimus, intervallo oculorum autem latiore costaque frontali in medio coaretata et pone antennas sensim fortius angustata divergens. Frons, genæ, pronotum et pleura distinctissime granulata, vertex remotius et obsoletius granulatus, fastigium laevigatum. Frons nonnihil obliqua. Costa frontalis in medio leviter coaretata, ante medium lateribus parallelis instructa, inter antennas latior, hinc basin et ocellum versus sensim angustata, basi fortiter angustata. Fastigium subhorizontale, obtuse triangulare, apiee rotundatum, marginibus sub-elevatis. Antennæ erassiseulae, leviter depresso, anguste ensiformes, capite pronotoque nonnihil longiores. Pronotum dorso obtusissime teres, carina subtili percurrente instructum, lobis ambobns æque longis, posteo posterius angulum obtusum formans. Elytra angustiuseula, ultra medium sat dense irregulariterque reticulata, apicem femorum posticorum superantia. Tuberculum prosternale cylindrieum, obtusum. Pedes remote setosi. Femora postica modice lata, margine dorsali distincte et minus dense serrato. Tibiae posticæ extus spinis septem vel octo armatae.

ALEUAS STÅL.

a. *Tibiae posticæ extus spinis sex vel septem armatae; cerci marium teretes, vix compressæ, mediocres, sensim acuminati; margo posticus segmenti dorsalis ultimi marium in medio lobos duos dentiformes contiguos emittens; pronotum fortius rugoso-punctatum; lobus posticus pronoti lobo antico circiter tertia parte brevior; carina pronoti distinctior; intervallum oculorum latum; ima basis tibiarum posticarum nigra.*

1. *A. vitticollis* STÅL. — Parce pilosus, luridus, interdum in ferrugineum vergens; vitta postoeulari capitidis, vittis una angusta dorsali media et duabus loborum lateralium pronoti, inter quas una ad dorsum, altera angustior ad limbum exteriorem pallescentem fuscis vel nigris, interdum evanescentibus; elytris flavescente-griseis, vitta posthumerali indistincta, ad vel ultra medium extensa, fusca; alis sordide hyalinis, in parte exteriore fusco-venosis; femoribus posticis interdum pallide olivaceo-flavescensibus, impressionibus arenatis lateralibus apicalibus nigris; tibiis tarsisque posticis sanguineis, illis basin versus cærulecentibus, spinis pallidis, apice nigris, in margine exteriore typice sex; elytris apicem femorum posticorum leviter superantibus, apicem abdominis hand attingentibus. ♂♀. Long. 35—51 mill.

♂. Lamina supraanalnis pone medium rotundato-angustata, apice angustato-producta; oculis majoribus, intervallo oculorum angustiore quam apud feminam.

Patria: San Leopoldo. (Mus. Holm.) Montevideo. (Coll. BRUNNER.)

Sequentibus maxime affinis, major et robustior. Caput in fronte et apice genarum remote punctulatum, præterea lævigatum. Fastigium transversum, obtusissime triangulare, apice rotundatum. Pronotum fortiter rugoso-punctatum, lobo postico posterius obtuso rotundato. Antennæ pronoto nonnihil longiores (σ) vel longitudine subæquales (Ω).

2. *A. gracilis* STÅL. — Præcedenti maxime affinis, differt statura graciliore; fastigio capitis minus obtuso, nonnihil magis prominulo, utrumque ad oculos lineola longitudinali nigra notato; fronte magis obliqua; pronoto posterius angulum obtusum formante, saltem in exemplo descripto pictura nigricante destituto, carina dorsali tantum ferrugineo-fusca; antennis, elytris alisque apicem abdominis nonnihil superantibus; femoribus posticis gracilioribus et intus vitta nigra ornatis; lamina supraanali marium fere usque a basi subsensim angustata. σ . Long. 31 mill.

Patria: Brasilia. (Coll. BRUNNER.)

Color exempli descripti olivaceo-flavescens. Tibiae et tarsi postici uti in specie præcedente picti. Margo exterior tibiæ posticæ, quæ restat in exemplo descripto, spinis septem armatus.

aa. *Tibiæ posticæ spinis typice octo extus armatae; cerci marium sat longi, præsertim apicem versus compressi, a basi ad medium sensim nonnihil angustati, dein apicem versus sensim leviter ampliati, margine superiore ante apicem rotundato; margo posticus segmenti dorsalis ultimi marium medio sinuatum, lobis destitutum; pronotum subtilius punctatum, haud rugosum; lobus posticus pronoti lobo antico nonnihil brevior, longior quam in divisione præcedente; carina pronoti minus distincta, subtilior; intervallum oculorum minus latum; pars basalis tibiarum posticarum tota pallida; vena radialis elytrorum basi nigricans.*

3. *A. lineatus* STÅL. — Virescens; ore pedibusque anterioribus dilute olivaceis; fasciola laterali frontis, pone antennas posita, plerumque quoque linea marginem interiorem oculorum sequente, nigris; pronoto vitta dorsali marginali angusta, per genas obsolete continua, fusca, ornato, quæ vitta in prouoto vitta angusta inæquali, in lobo antico subcallosa et lævigata, extus terminatur; margine mandibulari genarum marginaque exteriore calloso lobarum laterarium pronoti albicantibus; elytris hyalinis, ante medium virescentibus, area anali pallidissime testacea; alis vitreis; carina discoidali superiore lateris exterioris femorum posticorum saturatius virescente vel fusco-virescente; tibiis posticis luridis, apicem versus glaucis, spinis albicantibus, apice nigris; tarsis posticis testaceis; elytris apieem abdominis nonnihil superantibus. $\sigma\Omega$. Long. 25 35 mill.

σ . Lamina supraanalnis pone medium primum leviter, dein posterius subito fortius angustata, apice anguste producta.

Patria: Buenos Aires. (Mus. Holm.) Uruguay. (Coll. BRUNNER.)

Pictura pronoti interdum evanescit. Fastigium capitis transversum, obtusum, obtuse triangulare, apice rotundatum.

ECPHANTUS STÅL.

1. *E. quadrilobus* STÅL. — Virescens, remote pilosus; elytris alisque apicem abdominis leviter superantibus, illis apice angustis et oblique truncatis, his decoloribus, pallidissime virescente-venosis; margine dorsali et carina discoidali superiore lateris exterioris femorum posticorum dentibus acutis fusco-olivaceis remote armatis; capite pronotoque remote granulatis, hoc in lobo postico punctulato, crista arcuata, inter lobos fortiter intersecta; antennis linearibus, gracilibus, pronoto longitudine æqualibus. ♀. Long. 31 mill.

Patria: Queensland. (Mus. Holm.)

BIBRACTE STÅL.

1. *B. cristulata* STÅL. — Olivaceo-flavescens; pronoto fusco-marmorato; antennis fusco-sanguineis, basin versus dilutioribus; elytris fortiter abbreviatis, fuscis, parte fere dimidia interiore olivaceo-flavescente; lateribus abdominis nigro-fuscis; pedibus obscure olivaceis; femoribus posticis subtus tibiisque posticis viridi-olivaceis, his superne pone medium tarsisque posticis sanguineis; spinis tibiarum posticarum sanguineis, apice nigris. ♂. Long. 18 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice angulatim emarginatum; lamina supraanalnis triangularis, nonnihil longior quam latior, sulco longitudinali instructa; cerci mediocres, teretes, sensim gracilescentes, recti; lamina subgenitalis leviter prominula, obtusa; lobi metasternales leviter distantes.

Patria: Java. (Coll. BRUNNER.)

Quoad habitum et formam sculpturamque partium plurimarum *B. Hagenbachii* simillima, differt autem antennis brevioribus et crassioribus, pronoto fortius rugoso-punctato, cristato-carinato, postice obtusius angulato, elytris rudimentariis, oculisque nonnihil angustioribus et minus prominulis. Antennæ femoribus posticis nonnihil breviores. Caput, præsertim in fronte genisque, fortiter punctatum; costa frontalis ante medium lateribus parallelis instructa, pone ocellum basin versus sensim leviter ampliata, basi subito nonnihil angustata. Pronotum fortiter rugoso-punctatum, carina percurrente, sulcis transversis sat fortiter intersecta, in lobo antico leviter cristata, instructum, margine antico dorsi obtusissime subangulato; lobs posticus lobo antico dimidio brevior. Elytra paullo pone segmentum medianum extensa, ultra medium sensim ampliata, dein angusta, distantia. Femora postica apicem abdominis sat longe superantia, supra subtusque punctata, in margine dorsali et in carina superiore lateris exterioris remote distincteque serrata.

Praeter *B. Hagenbachii* HAAN species tertia bujus generis mihi cognita.

TRAULIA STÅL.

Xiphocera p. SERV.

a. *Pedes anteriores intus nigri; femora postica nigra, flavo-picta; tibiae posticæ annulo flavescente prope basin ornata.*

1. *T. azureipennis* SERV. (= *dimidiata* HAAN.)

2. *T. flavo-annulata* STÅL, Rec. Orth. 1. p. 58. 1. (1873.)

aa. *Femora et tibiae anteriores intus tantum apice nigra; femora postica magna parte sanguinea; tibiae posticæ prope basin superne fascia obsoleta sordide flavescente notatae.*

3. *T. sanguinipes* STÅL. — *T. azureipenni* simillima, differt pictura pedum; pedibus anterioribus sanguineo-flavescens, femoribus tibiisque apice intus tarsisque intus nigris; femoribus posticis sanguineis, superne infuscatis, fascia flavescente prope apicem ornatis, genubus nec non vitta ad marginem superiore areæ discoidalis exterioris, pone medium femorum ampliata, ad fasciam flavescentem abbreviata, nigris; tibiis nigricantibus, subtus subsanguineis, basi fascia obsoleta sordide flavescente notatis; tarsis posticis flavescentibus, intus nigris; elytris alisque completis. ♀. Long. 31 mill.

Patria: Borneo. (Coll. BRUNNER.)

MESAMBRIA STÅL.

1. *M. maculipes* STÅL. — Subferruginea; antennis ante apicem infuscatis; vitta angusta lobi lateralium pronoti, ad dorsum posita, posterius subito fortiter ampliata, macula inferiore coxarum posteriorum et trochanterum anteriorum, maculis nonnullis parvis inferioribus et lateralibus femorum anteriorum, fasciis duabus angustis inferioribus tibiarum anteriorum, maculis tribus parvis femorum posticorum, una majore exteriore basali et duabus dorsalibus, inter quas una basalis et una ante medium posita, apice spinarum tibiarum posticarum, articulo secundo et basi apiceque articuli tertii tarsorum anteriorum nec non tarsis posticis fere totis nigricantibus; pectore lateribusque abdominis fusco-conspersis. ♀. Long. 28 mill.

Patria: Celebes. (Coll. BRUNNER.)

Statura fere *Aristae mordacis*. Caput, dorsum et latera thoracis distincte, dorsum abdominis anterius obsoletius irregulariter reticulato-rugosa. Antennæ crassiusculæ, basin versus depresso-sulcatae et levissime ampliatæ, capiti pronotoque longitudine æquales. Fastigium verticis subhorizontale, triangulare, subtransversum, concaviusculum. Tempora subimpressa, distinctiuscula, triangularia. Costa frontalis angusta, leviter marginata, basi sulcata, ante antennas leviter coarctata, hinc apicem versus sensim leviter ampliata, parte basali sat fortiter antrorsum in axem corporis prominula. Carinae laterales frontis

leviter divergentes; prope apicem obsoletæ. Vertex pone fastigium earina subtili instructus. Pronotum dorso planiusculum vel obsolete transversim convexum, basi apiceque truncatum, carina obtusa percurrente instructum, margine basali medio leviter emarginato, ad emarginaturam utrimque obtusissime sublobato; dorsum cum lobis lateralibus angulum formans; vitta nigra loborum lateralium opaca, laevigata. Elytra circiter quintuplo longiora quam latiora, intervallo oculorum vix latiora, marginibus parallelis instructa. Tuberculum prosternale leviter curvatum. Intervallum loborum mesosternalium lobis latitudine æquale. Femora posticae medioeria, margine dorsali remote serrato. Tibiae posticæ extus spinis septem, intus spinis octo armatae.

2. *M. geniculata* STÅL. — Olivaceo-ferruginea, subitus pallens; fronte genisque ante medium palpisque stramineis; antennis pallide ferrugineo-flavescens; maculis partis mediæ parteque fere tertia apicali nigro-fuscis; pedibus anterioribus dilute olivaceis, superne fusco-conspersis; femoribus posticis apice utrimque et in disco exteriore fuscis; tibiis posticis dilute viridi-olivaceis, parte brevi basali apiceque spinarum nigris, illa superne macula basali sordide flavescente notata. ♀. Long. 26 mill.

Patria: Ceylon. (Coll. BRUNNER.)

Antennis longioribus, gracilioribus et linearibus, corpori dimidio longitudine æqualibus, fastigio capitis obtusiore, nonnihil declivi, temporibus haud discretis, cum fastigio confusis, oculis nonnihil latoribus et convexioribus, costa frontali inter antenas minus elevata, ante antenas haud coaretata, fronte genisque punctatis, pronoto minus distinete rugoso, in lobo postico punctato, dorso transversim convexiore, apice obtuse subrotundato, basi per totam latitudinem sensim obtuse emarginato, limite inter dorsum et lobos laterales sensim obtuse tereti, elytris a basi ultra medium angustissimis, posterius ampliatis, spina prosternali graciliore, recta, carina dorsali femorum posticorum subcompressa, tibiis posticis extus spinis sex, intus spinis septem armatis, a *M. maculipede* distinctissima.

GERENIA STÅL.

1. *G. obliquinervis* STÅL. — Subcinnamomea, subitus cum pedibus cinnamomeo-flavescens; antennis subitus ultra medium pallide flavescens; elytris alisque completis, illis ante medium macula discoidali nigra, subrotundata; carinis omnibus femorum posticorum remote serratis. ♀. Long. 41 mill.

Patria: India orientalis. (Coll. BRUNNER.)

Frons, genæ apicem versus, fastigium verticis, pronotum et pleura mesothoracis et metathoracis dense distincteque punctata; pronotum dense ruguloso-punctatum et in dorso granulis parvis obsoletis remote conspersum. Antennæ lineares, capite pronotoque unitis

nonnihil breviores. Fastigium sat declive, in costam frontalem sensim obtuse arcuatim continuatum, obtusum; tempora obliqua, magna, latera leviter declivia fastigii formantia, intus carina utrimque abbreviata subtili obtusaque limitata. Intervallum oculorum latum, oculis haud multo angustius. Costa frontalis lata, obtusa, basi vix angusta, fere a basi a ocellum sensim nonnihil angustata, dein lateribus subparallelis instructa, apicem versus sensim subevanescens. Oculi leviter convexi. Pronotum obtusissime subtectiforme, carina subtili percurrente instructum, margine antico obtusissime rotundato; lobus posticus lobo antico paullo longior, posterius angulum rectum, apice rotundatum formans. Elytra apicem femorum posticorum superantia, pellucida, basi opaciora, ante medium dense irregulariterque reticulata, pone medium sensim leviter angustata, (apice oblique rotundato-truncata?) margine costali anterius leviter ampliato; venæ transversæ partis dimidiæ apicalis inter ramos radiales positæ obliquæ, inter se angulum formantes. Alæ sordide hyalinæ, in area anali obsoletissime cœrulecentes, fusco-venosæ, area radiali apicem versus subinfuscata. Intervallum loborum mesosternalium æque longum ac latum. Pedes anteriores fusco-conspersi. Femora postica sat lata et crassa, area exteriore inferiore infuscata, carinæ, quæ illam aream limitant, fusco-maculatæ. Tibiæ posticæ extus spinis novem armatæ, apicem versus supra subtusque sordide violaceæ, spinis pallidis, apice nigris. Tarsi postici sordide violacei.

2. *G. ambulans* STÅL. — Dilute cinnamomea; elytris fortiter abbreviatis, macula nigra notatis; femoribus posticis tantum in margine dorsali et in carina discoidalí exteriore superiorc serratis. ♀. Long. 27 mill.

Patria: Cambodja. (Coll. BRUNNER.)

Præcedenti maxime affinis, magnitudine minore, punctura fortiore, oculis magis convexis, minus distantibus, costa frontali angustiore, marginibus lateralibus leviter elevatis, lœvigatis et subparallelis instructa, carinis lateralibus frontis magis elevatis, pronoti lobo postico abbreviato et posterius angulum sat obtusum formante, elytris rudimentariis, lobis antico et dimidio postico pronoti unitis longitudine subæqualibus, ovalibus, apice in angulum subrectum terminatis, macula nigra elytrorum ad apicem fortiter appropinquata, extus truncata, intus fortiter rotundata, tuberculo prosternali breviore, intervallo loborum mesosternalium transverso, femoribus posticis intus nigro-bimaculatis, carinis plurimis femorum posticorum inermibus, carina discoidalí inferiore lateris exterioris crassiore, magis elevata, nitida et maculis paucioribus et majoribus nigris notata, tibiisque posticis extus spinis octo armatis, facile distinguenda.

CALLIPTENUS SERV.

a. *Corpus et femora postica breviora, robustiora; intervallum loborum mesosternalium transversum vel subtransversum; tibiæ posticæ*

extus spinis haud ultra decem armatæ; latera laminæ supraanalis marium anterius haud sinuata; cerci marium apice incisi.

1. *C. pedarius* STÅL. — Ferrugineo-flavescens; genis apicem versus, fronte lateribusque thoracis distincte punctatis; dorso pronoti depressiuscule, laeviusculo, in lobo postico obsoletissime punctato, opaco, carina distinctissima media carinaque distincta obtusa percurrente marginum lateralium nitidis; vitta angusta postoculari genarum, vitta verticis, in apicem pronoti continuata, vitta laterali dorsi abdominis, arcu laterali partis apicalis femorum posticorum, nec non basi tibiarum posticarum nigra; tibialis posticis extus spinis octo apice nigris armatis; vitta nigra verticis linea pallida notata; elytris rudimentariis. ♂. Long. 32 mill.

♂. Lamina supraanalis anterius lateribus parallelis instructa, dein utrimque rotundata et apicem versus sensim angustata; cerci extus maxima parte nigri, in medio apicis anguste incisi, apice igitur bilobi, lobo inferiore quam lobo superiore nonnihil latiore et longius producto.

Patria: India. (Coll. BRUNNER.)

Inter species mihi cognitas *C. italicus* proximus, et cum hoc ad divisionem b¹⁾) generis referendus, distinctissimus fronte distinctius punctata, costa frontali basi angustata, oculis minoribus, pronoto basi obtussissime angulato et lobo postico breviore instructo, elytris rudimentariis, late ellipticis, paullo pone segmentum medianum extensis, nonnihil distantibus, tuberculo prosternali conico, sensim subacuminato, lobis mesosternalibus nonnihil minus brevibus, igitur proportionaliter minus transversis, femoribus posticis subtus minus ampliatis, articulo primo tarsorum posticorum breviore, lamina supraanalii nonnihil latiore, apice cereorum aliter formato, nec non pictura. Tibiae posticæ extus spinis octo armatæ.

aa. *Corpus et femora posteriora longiora et graciliora; inter vallum loborum mesosternalium angustum, multo longius quam latius; tibiae posticæ extus spinis duodecim — quatuordecim armatae; latera laminæ supraanalis marium anterius sinuata; cerci marium apice integri, intus per partes duas tertias apicales subexcavatae; habitus Euprepocnemidis.* — *Demodocus* STÅL.

2. *C. capensis* THUNB. — *Pezotettix (Euprepocnemis) capensis* STÅL, Rec. orth. 1. p. 76. 6. (1873.)

Patria: Calcutta. (Coll. BRUNNER) sine patria in Mus. Holm

RHYTIDOCHROTA STÅL.

a. *Tibiae posticæ in margine exteriore spinis septem armatae; antennæ longissimæ; pars interantennalis costæ frontalis fortiter prominula; caput a basi oculos versus distincte ascendens; pronotum anterius distincte adscendens; femora postica pone medium gracilia.*

¹⁾ Vide STÅL, Obs. orth. 2. p. 3.

b. *Tuberculum prosternale basi crassum et obtuse elevatum, apice in spinam longiorem abiens; pars interantennalis costæ frontalis fortiter prominula; intervallum oculorum costa frontali circiter duplo latius; antennæ minus graciles, magis minusve distincte ensiformes; pedes longi; femora postica longa, in carinis omnibus vel plurimis tuberculata vel denticulata; articulus tertius tarsorum posticorum articulis duobus basalibus unitis nonnihil longior; tympanum adest.*

c. *Femora postica in carinis omnibus distinctissime armata, posterius inermia vel obsoletius denticulata; costa frontalis angustata, sulcata, marginibus sat elevatis; margo apicalis dorsi femorum posticorum denticulo acuto armatus.*

1. *R. ensicornis* STÅL. — Obscure viridi-olivacea, rugosa, remote pilosa; antennis, basi excepta, subsanguineis, basin versus superne infuscatis; pedibus anterioribus, tibiis posticis apicem versus tarsisque posticis miniatis; lateribus dorsi abdominis in miniatum leviter vergentibus; spinis tibiarum posticarum nigris. ♂. Long. corp. 24, ant. 25, fem. post. 21 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice distincte angulariter emarginatum; lamina supraanalís triangularis, in parte tertia basali obtuse sulcata, pone partem eandem transversim subimpressa; cerci breves, teretes, sensim gracilescentes; lamina subgenitalis brevis, obtusa.

Patria: Panama. (Coll. BRUNNER.)

Coloribus verisimiliter varians. Habitu formaque partium *R. sellatae* simillima, ab hac specie magnitudine majore; antennis longioribus et distincte ensiformibus; costa frontali sulcata; pronoti dorso utrimque inter sulcos duos posteriores tuberculo lateralí leviter extrorsum vergente armato, lobo postico carina alte cristata prædicto; mesonoto, metanoto et abdomine anterius fortius rugosis; mesonoto et metanoto basi tuberculo altiore præditis; mesonoto utrimque tuberculo longitudinali extrorsum nutante, granoso, metanoto utrimque ruga longitudinali granosa instruetis; pedibus, uti videtur, longioribus; femoribus posticis plus quam dimidiis ultra apicem abdominis extensis, in carinis omnibus longitudinalibus distinctius obtusiusculè dentatis, in parte apicali tamen inermibus, dentibus carinarum lateris interioris majoribus; spinis tibiarum posticarum, præsertim interioribus, multo longioribus; pectore, etiam posterius, fortius rugoso.

2. *R. varicolor* STÅL. — Corallina vel subolivaceo-nigra; antennis longissimis, angustissime obsoletissimeque subensiformibus; spinis tibiarum posticarum nigris. ♂♀. Long. 22—32 mill.

Patria: Medellin Columbiæ. (Coll. BRUNNER.)

R. ensicorni et *sellatae* simillima et maxime affinis; ab ambabus dorso thoracis et segmento mediano granosis, haud rugosis, divergens. Forma antennarum, segmentis dorsi thoracis postice minus fortiter tuberculatis. mesonoto metanotoque tuberculo vel ruga lateralí granosa destitutis, femoribusque tantum dimidiis apud marem abdomen superantibus a *R. ensicorni* facile distinguenda et his in characteribus cum *R. sellata* optime conveniens, antennis autem longioribus instructa.

Femora postica illis *R. ensicornis* similia, margine apicali dorsi autem denticulo acuto minore, distinctissimo tamen, instructa. Spinæ tibiarum posticarum longiores quam in *R. sellata*, breviores quam in *R. ensicornis*. Pectus subgranoso-punctatum, disco et posterius lævigatum. Costa frontalis basin versus sensim leviter angustata. Antennæ partim mutilæ in exemplis descriptis.

cc. Femora postica in carinis dorsalibus ante medium minus distincte vel obsolete denticulata, in carinis inferioribus inermia vel remotissime, obtusissime obsolete subserrata, dorso in medio marginis apicalis dente obtuso armata; costa frontalis punctata, non nisi anterius subsulcata; spinæ tibiarum posticarum minus longæ, mediocres; antennæ basin versus vix latices.

3. *R. sellata* STÅL, Rec. orth. 1. p. 55. 3. (1873.)

Patria: Nova Granada. (Mus. Holm.)

b. Tuberculum prosternale obtuse elevatum, apice spinula brevi et obtusa armatum; pars interantennalis costæ frontalis minus fortiter prominula; antennæ graciles, lineares: pedes minus longi; femora postica minus longa, tantum in carina dorsali ante medium remote et minus distincte serrata; articulus tertius tarsorum posticorum articulis duobus basalibus unitis longitudine æqualis; intervallum oculorum costæ frontali latitudine subæquale; tympanum nullum vel obsoletessimum.

4. *R. pilosa* STÅL. — Dilute olivaceo-flavescens, sat dense pilosa; geniculis posticis dilute sanguineis; margine apicali dorsi femorum posticorum, tibiis posticis subtus nec non harum spinis apice nigris. ♂. Long. corp. 17, ant. 14, fem. post. 11 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice in medio rectangulariter emarginatum, ad emarginaturam utrimque in denticulum apice nigrum prominulum; lamina supraanalis triangularis, anterius sulco obtuse longitudinali et pone illum sulco transverso instructa, disco granulis nonnullis nigris prædicta; cerci breves, teretes, sensim gracilentes; lamina subgenitalis brevis, obtusa.

Patria: Peru. (Coll. BRUNNER.)

Præcedentibus, præsertim *R. sellata*, affinis, ab hac specie notis supra allatis, costa frontali latiore, ocellum versus subangustata, oculis multo minus distantibus, lobis mesosternalibus fortius divergentibus, mesonoto et metanoto basi in medio obsolete subcarinato-elevatis, corpore densius piloso femoribusque posticis vix plus quam tertia parte apicali abdomen superantibus divergens. Caput, dorsum corporis et pectus anterius sat fortiter rugosa.

aa. Tibiae posticæ in margine exteriore spinis octo armatæ; pars interantennalis costæ frontalis levissime prominula; caput oculos versus haud vel vix adscendens; pronoto anterius haud adscendens, margine antico haud vel vix reflexo; femora postica modice longa, posterius minus gracilia; antennæ lineares; intervallum oculorum costa frontali haud vel vix latius.

d. Pronotum dorso utrimque maculis lævigatis, subelevatis, subcallosis, instructum.

5. *R. antennata* STÅL, Rec. orth. 1. p. 55. 2. (1873).

Patria: Remedios Columbiæ. (Mus. Holm.)

6. *R. lœvifrons* STÅL. — Subferrugineo-olivacea, parce pilosa; capite nigro, fascia subapicali, per frontem et genas ducta, flavecente; pedibus virescente-olivaceis, geniculis posticis subsanguineis; spinis tibiarum posticarum pallidis, apice nigris; maculis lateralibus serie positis dorsi thoracis et abdominis dilute olivaceis. ♀. Long. corp. 18, ant. 10, fem. post. 11 mill.

Patria: Ad flumen Amazonum. (Coll. BRUNNER.)

A *R. antennata* differt antennis gracilioribus; capite maxima parte lœvigato et tantum in parte intraoculari frontis et lateribus verticis punctato; costa frontali latiore, lœvigata, tantum anterius punctata, haud impressa, marginibus parallelis, haud elevatis; dorso thoracis et abdominis uti in *R. antennata* dense fortiterque rugoso-punctatis, hoc autem serie laterali macularum oblongarum lœvigatarum notato, maculis lateralibus duabus pronoti minoribus, mesonoto et metanoto utrimque macula parva lœvigata instructis, macula laterali segmenti mediani minore et angustiore; tuberculo prosternali obtusiore et apice tuberculo minutissimo obtuso instructo; feinoribus posticis tantum in carina dorsali remote serratis, a supero visis minus crassis; tympano nullo distincto.

dd. *Dorsum corporis maculis lœvigatis, subcallosis, destitutum; tympanum distinctum; femora postica subinermia, tantum in carina dorsali anterius remotissime et obsoletissime subserrata.*

7. *R. turgida* STÅL, Rec. orth. 1. p. 54. 1. (1873.)

Patria: Antioquia Columbiæ. (Mus. Holm.)

8. *R. Brunneri* STÅL. — Obscure olivaceo-viridis; antennis, palpis, cercis geniculisque posticis subsanguineis. ♂. Long. corp. 14½, ant. 8, fem. post. vix 10 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice in medio obtusangulariter emarginatum, ad emarginaturam utrimque in dentem parvum nigrum prominulum; lamina supraanal triangularis, basi longitudinaliter impressa, marginibus impressionis obtuse elevatis; cerci breves, sensim gracilescentes; lamina subgenitalis brevis, obtusa.

Patria: Columbia. (Coll. BRUNNER.)

R. turgideæ, cuius tantum femina mihi cognita, proxima, ab illa specie divergit, corpore graciliore, dorso ante medium haud tumecente, capite dorsoque corporis, præsertim dorso abdominis, minus dense et minus fortiter punctatis, costa frontali sulcata, sulcis pronoti fortius impressis, intervallis sulcorum teretiusculis.

NICARCHUS STÅL.

1. *N. erinaceus* STÅL. — Pallide olivaceo-viridis; vitta lata lateraliter postoculari pronoti cinnamomea, utrimque anguste fusco-

marginata; lateribus mesothoracis et metathoracis femoribusque posticis dorso ante medium in cinnamomeum vergentibus; femoribus posticis intus ante medium et subtus a basi ultra medium tibiisque posticis pone medium sanguineis. ♂. Long. 17 mill.

♂. Margo apicalis segmenti dorsalis ultimi ante laminam supra-analem rectus, integer, denticulis quinque nigris armatus; processus interior cercorum apicem versus niger; lamina supraanalnis triangularis, paullo longior quam latior, tuberculis nonnullis parvis nigris, duplice serie positis, instructa, marginibus lateralibus sensim levissime rotundatis; lamina subgenitalis breviter subconico-prominula.

Patria: Panama. (Coll. BRUNNER.)

Caput remote obtuseque rugosum, pone oculos ad verticem ruga oblique longitudinali pallida distinctiore instructum. Vertex inter partem posteriorem oculorum tuberculis tribus parvis, lateralibus ad oculos positis, instructus, inter oculos leviter declivis; fastigium horizontale, longitrorsum excavatum, fere longius quam latius, triangulare, marginibus ante medium lobulo rotundato instructis, apice emarginatum. Costa frontalis percurrentes, marginibus elevatis instructa, basi leviter angustata, dein ultra medium lateribus parallelis praedita, in parte tertia subapicali leviter ampliata, marginibus apice fortius elevatis. Carinae laterales frontis subparallelæ, apicem attingentes, lobos tres, apicem frontis versus sensim maiores, gerentes. Intervallum oculorum angustiusculum, parte interantennali costæ frontalis nonnihil latius. Pronotum rugosum, in lobo postico punctatum, carina percurrente, in lobo antico lobos duos magnos, altissimos, acuminatos, et ante lobos dentem acutum gerente, in lobo postico posteriorius in lobum obliquum elevata, instructum; margines laterales dorsi in lobo antico primum antrorum convergentes, dein divergentes, dentibus quattuor, anterioribus duobus distantibus parvis, posterioribus duobus maximis, extrorsum vergentibus, armati; lobus posticus lobo antico brevior, posterius angulum acutiusculum formans; lobi laterales ad margines anticum et posticum tuberculis nonnullis fuscis vel nigris instructi. Elytra et alæ abbreviata, vix pone medium abdominis extensa, illa densiuscula reticulata, pone lobum obtusum medium marginis costalis sensim angustata, apice rotundata. Alæ sordide hyalinæ. Tuberculum prosternale conicum. Lobi mesosternales sensim nonnihil divergentes, vix transversi, basi intervallo latitudine subæquales. Lobi metasternales sat distantes. Femora postica apicem abdominis sat longe superantia, in carinis dentata; dentes carinarum inferiorum parvi, carinarum superiorum illis maiores, dentes tres vel quattuor carinae discoidalis exterioris superioris maximi; carina dorsalis apice in spinam magnam abiens; anguli geniculares in dentem prominuli. Tibiae posticæ extus spinis septem armatae. Antennæ et tarsi postici exempli descripti desunt. Tympana haud immersa.

DEMONAX STÅL.

1. *D. cristulatus* STÅL. — Pallide olivaceo-flavescens, obscure olivaceo-variegata; alis infuscatis; lateribus thoracis femoribusque posticis subsanguineo-maculatis. ♂. Long. 19 mill.

♂. Margo apicalis segmenti ultimi abdominis sensim leviter sinuatus, prope angulos basales laminæ supraanalis obtuse emarginatus, in medio lobulis duobus minutis contiguis instructus, ante laminam niger; lamina supraanalis nonnihil transversa, lateribus a basi ad medium sensim leviter convergentibus, in medio angulum rectum apice nigrum formantibus, pone angulum leviter sinuatis et subito fortiter convergentibus, apice obtusangulo; cerci breves. crassi, intus ante medium processum longum, curvatum, subcompressum, nigrum, emittens, lamina subgenitalis obtusa, apice processu transverso, brevi, emarginato, instructa.

Patria: Peru. (Coll. BRUNNER.)

Caput lœviusculum, in genis parce rugosum. Frons testacea; costa carinisque lateralibus olivaceo-flavescens, obscure olivaceo-conspersis, illa lateribus parallelis instructa, medio leviter coarctata, pone medium obtusa, immarginata, obtuse arcuatim elevata et punctata, ante medium carinis duabus obtusis representata. Fastigium modice declive, obtusum, subrotundatum, cum costa angulum fere formans, obtuse lateque sulcatum. Intervallum oculorum angustiusculum, latitudine costæ frontalis. Oculi magnitudine medioeres, late ovales, fortiter prominuli. Pronotum et pleura remote obscure olivaceo-punctata, illius lobis lateralibus disco testaceo-indutis, extus purius flavescentibus et olivaceo-maculatis. Dorsum pronoti obtuse tertiusculum, in lobo postico planiusculum et retrorsum leviter adscendens, antice quoque leviter adscendens et carinula longitudinali obtusa instructum, lobo postico carina, retrorsum sensim cristato-elevata, instructo; margo anticus rotundatus, margo posticus subtruncatus; lobus posticus lobo antico fere plus dimidio brevior. Mesopleura et metapleura macula testacea vel subsanguinea notata. Elytra alæque nonnihil pone medium abdominis extensa, illa pone medium sensim angustata, apice angustata et rotundata, minus dense reticulata, pone medium maculis fuscis sparsa. Alæ obtusæ, posterius fortiter rotundatæ, fere æque latae ac longæ. Tuberculum prosternale leviter elevatum, obtusissimum. Lobi mesosternales subquadrati, intervallo nonnihil latiores. Lobi metasternales leviter distantes. Femora antica incrassata, remote punctulata. Tibiae anteriores leviter curvatae. Femora postica latiuscula, apicem abdominis nonnihil superantia, in margine dorsalی acute serrulata, ante medium sanguineo-varia, carinis exterioribus olivaceo-maculatis. Tibiae et tarsi postici sat dense pilosi, illæ extus spinis sex armatae. Antennæ lineares, pallescentes, femoribus posticis longitudine subæquales. Tympana retrorsum vix immersa.

OMMATOLAMPIS BURM.

1. *O. palpata* STÅL. — Olivaceo-virescens vel flavescens, remote pilosa; palpis, parte dimidia anteriore froutis genarumque nec non limbo latissimo exteriore loborum lateralium pronoti, interdum quoque fastigio verticis pallide sordide flavescentibus; spinis tibiarum posteriorum apice nigris. ♂♀. Long. 22—42 mill.

♂. Oculi majores, fortiter convexi; elytra angusta, elongata, apicem versus vix ampliata, intervallo oculorum vix latiora, apicem segmenti mediani attingentia; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi ante angulos laminae supraanalis subsinuatus, ante laminam truncatus, in medio leviter emarginatus, denticulis obtusis sex nigris instructus; lamina supraanalis triangularis, nonnihil longior quam latior, apice subito angustata, tuberculis parvis nigris duplii serie positis praedita, marginibus lateralibus longe ultra medium reflexis; cerci breves, conici, intus prope basin processu compresso nigricante armati; lamina subgenitalis brevis, obtusa; lobi metasternales leviter distantes.

♀. Oculi minores, minus convexi; elytra minutissima, oblonga, intus magis rotundata, pone mesothoracem haud extensa; lobi metasternales sat distantes.

Patria: Peru. (Coll. BRUNNER.)

Habitu, punctura, forma pronoti loborumque sternalium *Ommatolampidi perspicillatae*¹⁾ simillima, ab hac specie autem fastigio verticis nonnihil magis declivi, parte basali frontis nonnihil minus elevata. margine antico dorsi pronoti distinctius reflexo, elytris minoribus, alio modo formati et unicoloribus, dorso abdominis posterius minus dense rugoso-punctato, articuloque ultimo palporum maxillarium nonnihil angustiore differt. Antennae graciles, lineares, longae. Tuberculum prosternale acuminatum, basi crassum. Femora postica apicem abdominis sat longe superantia (♂) vel haud attingentia (♀) modice lata, apicem versus graciliscula, in carinis omnibus denticulata. Tibiae posticae extus spinis typice septem armatae, pilis longioribus instructae. Costa frontalis ocellum versus haud sulcata.

AGESANDER STÅL.

1. *A. ruficornis* STÅL. — Olivaceo-virescens; antennis, interdum quoque labro, femoribus anterioribus, carinis exterioribus femorum posticorum, nec non lateribus ventris maculisque laminae subgenitalis maris sanguineo-indutis vel sanguineis; antennis apicem versus infuscatis. ♂♀. Long. 16—25 mill.

♂. Oculi mediocres, modice convexi; intervallum oculorum parte interantennalii costae frontalis paullo angustius; femora anteriores in-

¹⁾ In exemplo nostro hujus speciei antennae, tuberculum prosternale et pedes postici desunt.

crassata; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi sensim leviter sinuatus, in medio emarginatus, ad emarginaturam utrumque vix prominulus; lamina supraanalis lateribus anterius parallelis instructa, pone medium sensim rotundato-angustata, sulco longitudinali prædita, marginibus lateralibus reflexis; cerci mediores, compressiusculi, sensim acuminati, apice leviter incurvi, superne fere ante medium processu spiniformi, introrsum leviter vergente, armati; lamina subgenitalis leviter prominula, apice acuminata; intervallum loborum mesosternalium æque longum ac latum, lobis latitudine subæquale; lobi metasternales subcontigui.

♀. Oculi minores et minus convexi; intervallum oculorum parti interantennali costæ frontalis latitudine subæquale; intervallum loborum mesosternalium transversum; lobi metasternales sat distantes.

Patria: Columbia. (Mus. Holm et Coll. BRUNNER.)

Quoad puncturam pronoti et capitis cum *Dactyloto picto* congruens. Læve. Costa frontalis percurrens, basin versus parce punctata, marginibus lateralibus maxima parte parallelis et obtuse elevatis instructa, inter antennas leviter ampliata, basi leviter angustata et ibidem sulculo, in fastigium verticis continuato, instrueta. Carinæ laterales frontis obtusæ, distinctæ, leviter divergentes. Fastigium verticis subhorizontale, obtusum, apice emarginatum, basi fere coarctatum, sulcatum. Pronotum in lobo antico parce subtiliterque, in lobo postico dense distinreteque punctatum, sulcis quattuor transversis continuis instructum, dorso teres, apice subrotundatus, basi emarginato-truncatus, lobo postico brevi, carinato. Elytra rudimentaria, angusta, reticulata, vena longitudinali fere media distinctissima instructa, apicem segmenti mediani attingentia. Tympana retrorsum vix immersa. Tuberculum prosternale obtusissime subconicum. Femora postica impressione arcuata lateralí geniculari fusca, carinis inermibus. Tibiae posticæ basi ipsa nigræ, macula subbasali dorsali flavescente; margine exteriore spinis octo pallidis apice nigris armato. Antennæ breviuscule et crassiusculæ, lineares, capiti pronotoque unitis longitudine subæquales, articulis octodecem compositæ.

ANNICERIS STÅL.

1. *A. geniculatus* STÅL. — Dilute olivaceo-virescens, capite, thorace, elytris dorsoque abdominis anterior in exemplo descripto fusco-olivaceis; geniculis posterioris subsanguineis; tibiis posterioris apicem versus fusco-violaceis. ♂. Long. 13 mill.

♂. Oculi sat convexi, late ovales, modice longi; intervallum oculorum angustissimum; lobi metasternales posterius levissime distantes, subcontigui; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi rectus, lobulis minutis obtusissimis quattuor nigris instructus; lamina supraanalis triangularis, lateribus anterior rotundata, prope basin tuberculis duobus parvis nigris instructa; cerci breviuscule, crassiusculi,

acuminati, intus ante medium prope marginem inferiorem processu linearie compresso, obtuso, apice nigro, instructi; lamina subgenitalis obtusiuscula.

Patria: Peru. (Coll. BRUNNER.)

Quoad habitum speciebus *Proctolabi* subsimilis, facie autem obliquiore, costa frontali tantum inter antennas distingnenda, formaque partium analium abdominis maris ab illis divergens. Caput fere totum, thorax et dorsum abdominis anterius sat dense et fortinuscule punctata, vertice inter oculos fastigioque impunctatis. Frons sat fortiter obliqua, carinis lateralibus obsoletissimis, subtilissimis; costa tantum inter antennas distingnenda, ibidem arcuatim elevata, modice lata, basi haud angustata. Fastigium verticis sat fortiter declive, subtriangulare, apice truncatum, sulcatum. Vertex inter oculos leviter carinatus. Pronotum dorso teres, carina destitutum, basi apiceque obtussissime rotundatum; lobus anticus lobo postico fere duplo longior. Elytra pronoto nonnihil longiora, pone medium sensim nonnihil angustata, levissime distantia, circiter duplo longiora quam latiora. Tympana haud obliqua. Femora postica apicem abdominis longe superantia, in carinis inermia. Tibiae posticæ extus spinis sex armatae, pilosæ. Tarsi postici pilosi. Tuberculum prosternale basi crassum, apice spinula armatum. Antennæ exempli descripti mutilæ.

2. *A. nigrinervis* STÅL. — Dilute olivaceo-virescens, facie et parte exteriore lobarum lateralia pronoti in colorem flavescentem vergentibus; vitta postoculari genarum et pronoti obscure olivacea; elytris glauco-virescentibus; venis radialibus ultra medium nigris; alis leviter infuscatis, fusco-venosis; vertice utrimque ad marginem posticum oculorum maculis duabus parvis pallide flavescentibus notato. ♂. Long. 12 mill.

Patria: Nova Granada. (Mus. Holm.)

A præcedente, cui maxime affinis, differt vertice laeviusculo; fastigio apice obtuse et late rotundato; fronte pronotoque minus dense punctatis, hoc subrugoso et hic illuc vestigio carinæ instructo; elytris aliquæ longioribus, illis pronoto fere duplo longioribus, ultra medium abdominis extensis; lamina supraanali, quæ in nostro specimine est fortiter inflexa, uti mini videtur tuberculis subbasalibus nigris destituta; processu cercorum breviore; articulo secundo tarsorum posticorum nonnihil breviore, nec non notis in diagnosi allatis. Antennæ graciliusculæ, capite pronotoque unitis paullo longiores, lineares. Spinæ marginis exterioris tibiarum posticarum sex vel septem, verisimiliter typice sex.

DELLIA STÅL.

1. *D. insulana* STÅL. — Dilute virescente-olivacea, remotissime, in tibiis tarsisque posticis densius pilosa; antennis nigricantibus, apice imo leviter pallescentibus, articulis duobus basalibus

virescentibus; vitta nec non limbo exteriore fere toto loborum lateraliū pronoti fuseo-olivaceis, illa vitta per latera thoracis in basin abdominis extensa; mesopleuris macula subsanguinea notatis; macula lateralī apicis femorum posticorum nigra; tibiis et tarsis posticis glaucis, illarum spinis pallidis, apice nigris. ♂. Long. 18 mill.

♂. Oculi late ovales, sat convexi; intervallum oculorum costa frontali nonnihil angustius; margo apicalis segmenti dorsalis ultimi obtuse emarginatus, inermis; lamina supraanalis a basi ad medium sensim levissime angustata, dein utrimque subito angulum obtusum formans, pone angulum fortiter subsinuato-angustata, anterius sulculo et utrimque impressione lateralī media instructa; cerci longiuseculi et graciliuseculi, recti, sensim acuminati; lamina subgenitalis obtusa: lobi metasternalis postice contigui.

Patria: Cuba. (Mus. Holm.)

Habitu et forma partium speciebus *Coscineutae* similis. Frons, apice genarum, fastigium, vittæ dñæ divergentes verticis, dorsum pronoti dorsumque abdominis ultra medium densinseule et sat distincte punctata, latera pronoti parce punctata. Antennæ longæ, graciles, lineares. Costa frontalis sat longe versus apicem frontis continuata, inter antennas latior, hinc apicem versus sensim leviter, basin versus fortius angustata. Fastigium sat fortiter declive, transversum, obtuse subrotundatum. Pronotum capite angustius, dorso teres, carinæ loco linea leviuscula obsoleta instructum, apice leviter rotundatum et in medio sinuatum, basi emarginato-truncatum; lobus anticus lobo postico plus duplo longior. Elytra rudimentaria, angusta, lateralia, sensim subangustata, apicem segmenti mediani attingentia. Femora incirma, apicem abdominis superantia. Tibiæ posticæ extus spinis sex armatæ. Tuberulum prosternale conicum.

MASTUSIA STÅL.

1. *M. quadricarinata* STÅL. — Dilute olivacea; antennis, genis, lobis lateralibus pronoti, mesopleuris et metapleuris, elytris apiceque spinarum tibiarum posticarum nigris; antennis apice pallidis, basi olivaceis; vitta per verticem et dorsum pronoti ducta fusca; vitta per genas et latera thoracis ducta, nec non margine mandibulari genarum vittaque interiore elytrorum flavescentibus; femoribus anterioribus apice testaceis, posticis apice fuscis; tibiis posticis obscure glaucis; alis sordide subalbido-hyalinis. ♀. Long. 32 mill.

Patria: Peru. (Mus. Holm.)

Tetratæniæ surinamæ similis. Caput leviusculum, lateribus verticis punctulatis. Frons opaca, quadricarinata; carinæ nitidæ, duas mediæ, quæ costam representant, rectæ, parallelæ, laterales sensim divergentes, inter oculos curvatæ. Fastigium breve, obtusum, leviter impressum. Pronotum dorso et in parte posteriore loborum lateraliū densinseule et distinctissime punctatum, præterea in lobis

lateralibus parce punctatum; dorso carina obtusa instructum, basi apiceque obtusissime subrotundatum, lobo antico quam lobo postico duplo longiore. Elytra abbreviata, vix valvanta, medio latissima, hinc angustata, pronoto nonnihil longiora. Tuberculum prosternale acuminatum, spiniforme. Femora postica apicem abdominis nonnihil superantia. Antennae graciles, lineares, capite pronotoque unitis longitudine aequales. Margines valvularum genitalium exteriores denticulati.

CRANAË STÅL.

1. *C. patagiata* STÅL. — Olivaceo-flavescens; antennis, limbo lato costali elytrorum, alis, arcu utrimque laterali apicali femorum posticorum, apice spinarum nec non basi ipsa tibiarum posticarum nigricantibus; antennis apice et basin versus pallidis. ♂♀. Long. 23—30 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim obtuse emarginatum et dentibus duobus obtusis distantibus nigris instructum; lamina supraanalis subtriangularis, subtransversa, apice anguste rotundata, marginibus lateralibus fere ante medium obtuse subangulatis, ibidem sulculo transverso et ante sulculum macula parva nigra instructis; cerci sat longi, teretiusculi, sensim acuminati; lamina subgenitalis brevis, obtusa; oculi quam in femina fortius convexi.

Patria: Amboina. (Coll. BRUNNER.)

Caput et pronotum parce obsoleteque punctata, hoc basi et apice densius et fortius punctatum. Caput pronoto fere longius. Costa frontalis planiuscula, lateribus parallelis instruxta, sulculos discoidales versus sensim evanescens. Fastigium et pars anterior verticis sensim modice declivia, illud antrorsum angustatum, apice truncatum. Intervallum oculorum costa frontali nonnihil latius. Pronotum subtransversum, dorso teres, carina destitutum, basi apiceque obtusissime rotundatum. Elytra alaeque abbreviata, capite pronotoque unitis hand vel paullo longiora, nonnihil distantia; illa, limbo costali excepto, sat dense reticulata. Tibiae et tarsi postici sat dense et longe pilosi, hi longi, tibiis fere tertia parte breviores. Femora postica latiuscula et brevinsecula, apicem abdominis vix attin-gentia. Antennae longissimæ et gracillimæ.

LUCRETIILIS STÅL.

1. *L. taniata* STÅL. — Dilute olivaceo-virescens, in capite thoraceque olivaceo-flavescens; antennis nigris; costa, vittis duabus ante medium positis, ad ocellum incipientibus, hinc antrorsum divergentibus, nec non macula laterali media frontis, vittis duabus postocularibus genarum, vitta verticis anterius abbreviata, vittis tribus pronoti, una dorsali, unaque in lobis lateralibus, nec non horum

margine angusto exteriore, tibiis tarisque posticis obscure olivaceis vel fusco-olivaceis; limbo lato costali elytrorum alisque obscure fuscis; geniculis posticis apiceque abdominis rufo-testaceis; alis fuseis. ♂. Long. 20 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim sat fortiter emarginatum, margine apicali prope medium utrinque in lobulum obtusissimum ampliato; lamina supraanal triangularis, ante medium sulcata; cerci mediocres, sensim acuminati; lamina subgenitalis brevis, obtusa; oculi sat convexi.

Patria: Sumatra. (Coll. BRUNNER.)

Acridio unistrigato HAAN maxime affinis videtur. Frons, genae apicem versus, vittæ duæ verticis nec non pronotum sat dense et fortiter punctata. Frons sat obliqua. Costa frontalis leviter sulcata, lateribus subparallelis. Vertex inter oculos et fastigium modice declivia, hoc obtuse subtriangulare. Intervallum oculorum costa frontali vix latius. Pronotum capite nonnihil longius, dorso teres, carina destitutum, postice angulum obtusum formans. Elytra medium femorum posticorum attingentia, minus dense reticulata, apice oblique angustata. Femora postica apicem abdominis longe superantia, modice lata, apicem versus graciliscula, in carinis omnibus obtuse denticulata, denticulis nec non granulis areæ discoidalis obscure olivaceis. Antennæ longæ, graciles, partim mutilæ in exemplo descripto.

PHEMONOË STÅL.

1. *P. rufo-vittata* STÅL. — Olivaceo-nigra, siguaturis ante medium frontis genarumque, vitta laterali pronoti, anterius angustata et interrupta, per elytra late continuata, pedibus anterioribus nec non femoribus posticis a basi ad capitulum geniculare rufo-testaceis; palpis maxillaribus apicem versus sordide albicantibus. ♂♀. Long. 29—33 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice obtuse emarginatum et lobulis duobus parvis distinctis obtuse dentiformibus instructum; lamina supraanal triangularis, lateribus leviter rotundata, apice leviter producta, ante medium sulcata, disco transversim subuplicata; cerci mediocres, sensim gracilescentes; lamina subgenitalis obtusa, brevis; oculi modice convexi.

♀. Valvulae genitales rectæ, teretiuseculæ, leviter compressæ, inermes; oculi leviter convexi.

Patria: Amboina. (Coll. BRUNNER.)

Corpus crassiusculum. Caput et latera thoracis remote, dorsum pronoti densius distinete punctata. Frons leviter obliqua. Costa frontalis obtusa, anterius obtuse sulcata, ante sulculos leviter continuata, lateribus subparallelis. Intervallum oculorum costa frontali circiter duplo latius, in utroque sexu subæquale. Pronotum dorso

teres, carina destitutum, lobo postico quam lobo antico nonnihil breviore, posterius rotundato. Elytra et alae apicem abdominalis subattingentia, illa apice obtuse rotundata, sat dense seriatim reticulata, opaca, coriacea. Alae fuscae. Pedes crassiusculi. Femora postica valida, lata, apicem abdominalis leviter superantia (σ) vel vix attingentia (φ) supra subtusque punctata. Antennae longae, crassiusculae, nigrae.

NAUTIA STÅL.

1. *N. flavo-signata* STÅL. — Obscure olivacea, subtus cum pedibus pallidior; maculis parvis tribus lateralibus verticis ad oculos positis, vitta obliqua laterali frontis, ante antennas secundum oculos ducta, dein infra oculos per genas retrorsum continuata, maculis signaturisque pronoti, in vittas quattuor dispositis, laevigatis, callosis, dilute flavescentibus; vitta sat lata elytrorum dilute sordide flavescentibus; alis fuscis. φ . Long. 31 mill.

φ . Valvulae genitales graciles, breviusculae, rectae, inermes.

Patria: Panama. (Coll. BRUNNER.)

Caput, pronotum et pleura fortiter rugoso-punctata. Carinae laterales frontis deletae. Vertex inter oculos sat fortiter declive. Fastigium parviusculum, leviter sulcatum, levissime declive, cum costa frontali confusa Costa frontalis obtusa, inter antennas et sulculos transversos sulcata. Articulus primus antennarum, solus qui restat in exemplo descripto, magnus, costa frontali fere crassior. Pronotum carina destitutum, sulcis transversis distinctissimis instructum, margine antico leviter produeto et in medio sinuato, lobo antico quam lobo postico vix dimidio longiore. Elytra dense reticulata, coriacea, opaca, nonnihil ultra medium abdominalis extensa, sensim leviter angustata, apice rotundata. Pedes postici exempli descripti desunt.

OPHTHALMOLAMPIST SAUSS.

1. *O. cinctipennis* STÅL. — Dilute olivacea; antennis, basi excepta, nigris; elytris rudimentariis, angustis, distantibus, pone segmentum medianum leviter extensis, coriaceis, punctulatis, eburneis, limbis lateralibus violaceo-nigris, laevigatis, membranaceis; marginibus capituli genicularis femorum posticorum fusco-olivaceis. σ . Long. 18 mill.

σ . Segmentum dorsale ultimum apice emarginatum, margine apicali inter emarginaturam et cercos rotundato et nigro; lamina supraanalnis triangularis, parviuscula; cerci teretes, sensim acuminati; lamina subgenitalis obtusissime subconica, brevis.

Patria: Peru. (Coll. BRUNNER.)

O. geniculatae maxime affinis, capite pronotoque vittis flavescentibus destitutis, costa frontali prope basin latiore, elytris multo minoribus et alio modo pectis, femoribus posticis tantum in carina dorsali serratis, nec non intervallo loborum mesosternalium angustiore distinctissima.

TÆNIOPHORA STÅL.

1. *T. pulchripes* STÅL. — Dilute olivaceo-flavescens; pedibus dilute olivaceo-virescentibus; vitta verticis per dorsum pronoti continua, vitta postoculari genarum, per lobos laterales continua, limbo exteriore loborum lateralium pronoti, limbo exteriore et interiore elytrorum, capitulo femorum posticorum, basi parteque dimidia apicali tibiarum posticarum nigris; trochanteribus anticus, nec non femoribus omnibus basin versus dilute sanguineis; elytris angustis, distantibus, pone segnientum medianum leviter extensis. ♂. Long. 14 mill.

♂. Femora anteriora dorso crista vel dente destituta.

Patria: Santa Marta. (Coll. BRUNNER.)

Punctura formaque partium congenericis mihi cognitis simillima, elytris rudimentariis femoribusque anterioribus inermibus præsertim divergens.

Ommatolampis carinipes GERST. ad *Tæniophoram* referenda.

MEZENTIA STÅL.

1. *M. gibbera* STÅL. — Dilute olivaceo-flavescens; pronoto antice et posterius leviter ferruginante; elytris aliquo fuscis, illorum venis ferruginantibus, hic illic subflavescentibus; femoribus posticis extus et intus maculis duabus vel tribus magnis olivaceis notatis; tibiis posticis cum spinis nigricantibus, basi et extus olivaceo-flavescentibus; antennis nigricantibus, basi pallide olivaceis. ♂. Long. 30 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum sensim leviter productum, apice ante laminam supraanalem sensim obtusissime sinuatum et lobulis quinque dentiformibus obtusis decurvis nigris, lateralibus latioribus, obtusioribus et apice incisis, armatum; lamina supraanal triangularis, disco ante medium transversim subtiliter sulcata et tuberculis duobus minutis nigris iuncta, marginibus lateralibus late subreflexis, medio dente subacuto armatis; cerci validi, compressi, ante medium fortiter angulato-curvati, margine dorsali pone angulum nigro; lamina subgenitalis acuminata, modice producta.

Patria: Panama. (Coll. BRUNNER.)

Species maxime singularis. Caput breve, transversum, os versus angustum, obtusum, in vertice et apice genarum remote punctulatum;

fronte rugosa, costa rugoso-punctata. Costa frontalis lata, abbreviata, basi et ocellum versus leviter angustata, basi ante fastigium sub-prominula, leviter excavata. Fastigium transversum, breve, obtusum, sat fortiter declive. Intervallum oculorum latum, costa frontali latius. Oculi sat magni, fortiter convexi. Antennæ graciles, verisimiliter longæ, in exemplo descripto maxima parte mutilæ. Pronotum breve, rugoso-punctatum, dorso pone medium tuberculis pluribus instructum, carina destitutum, pone medium subito elevatum, sulcis transversis sat impressis; margo anticus bituberculatus, leviter reflexus, margo posticus obtuse rotundatus, quinquesinuatus; lobus posticus lobo antico dimidio brevior. Elytra et alæ abbreviata, illa capite pronotoque unitis nonnihil longiora, sensim sat fortiter angustata, apice angusta et rotundata. Pedes anteriores crassiusculi. Femora postica apicem abdominis subsuperantia. Tarsi postici longissimi.

HISYCHIUS STÅL.

1. *H. nigrispinus* STÅL. — Olivaceo-fuscescens; macula parva segmenti mediani ad tympana, nec non spinis tibiarum posticarum nigris. ♀. Long. 45 mill.

Patria: Pern. (Mus. Holm.)

Statura *Onmatolampidis palpatæ*, cui simillimus, sed punctura densiore et subtiliore, costa frontali sulcata, sulcis pronoti minus fortiter impressis, femoribus posticis latioribus, corpore aptero et ceteris divergens. Caput et dorsum thoracis abdominisque dense et fortiuscule, in vertice et dorso abdominis tamen minus fortiter, punctata. Antennæ gracillimæ, lineares, longæ, in exemplo descripto partim mutilæ. Costa frontalis sulcata, lateribus parallelis instructa, ad sulculos transversos coaretata, ante sulculos in formam rugarum duarum subtilium et obsoletarum breviter continuata. Vertex inter oculos nonnihil declive. Fastigium leviter declive, sulcatum, apice sinuatum, sulco cum sulco costæ frontali continuo. Pronotum teres, carina destitutum, basi truncatum, tuberculis minutissimis praesertim ad margines remote conspersum; margo anticus leviter productus, medio leviter sinuatus; lobus posticus brevissimus. Mesonotum in margine basali minute tuberculatum. Metanotum parce minuteque tuberculatum. Femora postica apicem abdominis attingentia, in carinis omnibus obtuse denticulata, denticulis alternis carinæ discoidalis inferioris lateris exterioris femorum posticorum nigricantibus. Tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis sex armatae. Tibiae et tarsi postici pilosi.

DICÆARCHUS STÅL.

1. *D. cribellatus* STÅL. — Ferrugineo-olivaceus; pedibus anterioribus dilutioribus; antennis nigris; capite, lineis exterioribus nec

non latere interiore pedum anteriorum, areaque discoidali exteriori femorum posticorum fusco-olivaceis; fascia angusta media frontis, per genas obsolete continua, limbo exteriore loborum lateralium pronoti, macula mesopleurorem ad coxas nec non carinis femorum posticorum ferrugineo-flavescens; elytris rudimentariis palpisque sordide flavescens; pectore, ventre, femoribus posticis subtus, tibiis tarsisque posticis subsanguineis; geniculis posticis nigris. ♀. Long. 17 mill.

Patria: Columbia. (Coll. BRUNNER.)

Quoad habitum, formam generalem capitis, pronoti elytrorumque, longitudine et crassitie antennarum *Agesandro ruficorni* sat similis. Caput at segmenta dorsalia corporis dense fortiterque rugoso-punctata. Costa frontalis angustiuscula, lateribus parallelis instructa, haud sulcata, ad sulculos transversos abbreviata. Fascia pallida frontis lavigata. Vertex anterius cum fastigio leviter declive, hoc triangulare, subtransverso, apice anguste truncato. Antennae breviusculæ, crassiusculæ, lineares, articulis septemdecim compositæ. Pronotum teres, vestigio obsoletissimo carinae instructum, sulcis transversis distinctissimis praeditum, basi apiceque truncatum, lobo postico brevisimo. Femora postica apicem abdominis leviter superantia, modice lata. Tibiae posticæ extus, præter spinam apicalem, spinis septem armatae. Elytra angusta, sensim leviter ampliata, apicem segmenti mediani attingentia.

EUTHYMYIA STÅL.

1. *E. brevifrons* STÅL. — Olivacea; elytris obsolete fusco-nebulosis; alis sordide hyalinis, limbo posteriore sat late infuscato; arcu laterali capituli femorum posticorum apiceque spinarum tibiarum posticarum nigris. ♀. Long. 50 mill.

Patria: Borneo. (Coll. BRUNNER.)

Ab *E. melanocerca*, cui sat similis, differt magnitudine majore, capite pronotoque nonnihil fortius et minus dense punctalis, capite quam pronoto latiore, fronte breviore, costa frontali marginibus obtusioribus et magis teretibus instructa, basi utrinque ad ocellos depresso, margine antico pronoti medio distincte sinuato, sulcis pronoti distinctius impressis, elytris aliquo longioribus, apicem femorum posticorum nonnihil superantibus, illorum margine costali non nisi obsoletissime sinuato, femoribus posticis in margine dorsali minute serratis, tibiis posticis extus, præter spinam apicalem, spinis septem vel octo armatis, nec non pictura.

LENTULA STÅL.

1. *L. obtusifrons* STÅL. — Dilute olivaceo-virescens vel ferrugineo-grisescens; vitta per partem inferiorem genarum laterumque

thoraeis ducta pallidiore; orbitis oculorum angustis, areu laterali capitulo femorum posticorum, tibiis posticis basi inferne apiceque spinarum, nec non vittis duabus laminae supraanalis nigris; tibiis tarsisque posticis corallinis. ♂♀. Long. 20—29 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim sat fortiter angulatum emarginatum; lamina supraanalis granulis conspersa, in medio longitudinaliter leviter elevata, ante medium sulcata, lateribus ante medium subparallelis instructa, posterius triloba, lobo medio major et longius producto; eerci medioeres, basin versus subcompressi, apicem versus sensim acuminati; lamina subgenitalis sensim nonnihil compresso-producta; intervallum oculorum modice latum, costa frontali nonnihil angustius; lobi metasternales contigui.

♀. Intervallum oculorum latum, parte interoculari eostae frontalis nonnihil latius; lobi metasternales in medio subcontigui.

Patria: Port Natal. (Coll. BRUNNER.)

Statura fere *Euthymia melanoceræ*. Caput et thorax dense distinctissimeque punetata, dorsum abdominis transversim subaciculato-punctatum, anterius distinctius punctatum. Caput obtusissimum; fastigium brevissimum, fortiter declive, obtusissimum. Costa frontalis obtusissima, carinis duabus subpercurrentibus, in marginibus fastigii continuatis, representata, inter antennas levissime elevata, parte inter carinas et antennas posita antennas versus oblique levissimeque declivi. Carinæ laterales frontis subtile, apicem versus sensim leviter convergentes. Oculi mediocre, leviter convexi. Antennæ exemplorum descriptorum mutilæ. Pronotum dorso teres, carinæ loco linea lœviuscula instructum, basi apiceque truncatum, sulcis transversis obsoletissimis, lobo postico brevi. Elytra et alæ nulla. Tuberculum prosternale breve, crassum, obtusum. Femora postica apicem abdominis attingentia vel subattingentia, rugis transversis lateris exterioris obtusissime pallido-subgranosus. In exemplo feminino descripto margo posticus pronoti maculis parvis pallidis notatus, margo posticus segmentorum dorsalium abdominis minute nigromaculatus.

BERMIUS STÅL.

a. *Corpus minus elongatum; caput latius; frons minus obliqua; fastigium verticis obtusum, transversum; femora postica denticulo apicali dorsali parvo, angulis apicalibus dorsalibus obtusis, rotundatis. lobisque genicularibus minus productis et manus fortiter acuminatis instructa; elytra apicem femorum posticorum minus longe superantia vel sat abbreviata; spina prosternalis minus gracilis; margines tibiarum posticarum apicem versus angustissime laminati; margo costalis elytrorum feminarum anterius leviter rotundatus.*

b. *Tibiae posticæ subtus vitta nigra destituta; lobi geniculares femorum posticorum macula fusca destituti.*

1. *B. brachycerus* STÅL. — Virescens, remotissime pilosus; vitta postoculari genarum, per partem superiore laterum thoracis dueta, nigro-fusca, utrimque albicante-marginata; antennis subtestaceis, capite et dimidio pronoto unitis vix longioribus; elytris apicem femorum posticorum nonnihil superantibus, pellucidis, basin versus virescentibus et opacis, venis ulnaribus subtestaceis vel infuscatis; alis decoloribus, venis pallide testaceis; vitta areæ discoidalis femorum posticorum ad carinam superiore fusco-olivacea; spinis tibiarum posticarum apice nigris; fronte remote subtiliterque fusco-conspersa; pronoto remote et obsoletinseule, autice et in lobo postico densius et distinctius punctato; margine exteriore loborum lateralium pronoti subtiliter calloso, albicante. ♀. Long. 33 mill.

Patria: Australia. (Mus. Holm.) Sydney. (Coll. BRUNNER.)

Habitu picturaque *Oxyæ veloci* similis.

bb. *Tibiae posticæ glanco-virescentes, subtus vitta nigra, ad basin incipiente, ultra medium lata, apicem versus angustata et marginem tantum exteriorem tibiarum occupante, ornata; venæ radialis et ulnaris exterior elytrorum fuscantes vel fuscæ; lobi geniculares femorum posticorum antice macula parva fusca notati.*

2. *B. odontocerus* STÅL. — *B. brachycero* simillimus, differt antennis longioribus, pallidioribus et fusco-variegatis, vitta laterali nigricante hand albicante-marginata, intervallo elytrorum inter costam et radium anterius nonnihil minus dense reticulato, femoribus anterioribus apice macula minutissima exteriore nigra notatis, femoribus posticis apice utrimque arcu fusco instructis, pictura tibiarum posticarum coloreque laterum corporis pedunque virescente-flavescente. ♂♀. Long. 25—34.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim sinuatum; lamina supraanalis retrorsum sensim angustatum, anterius utrimque subrotundatum, postice subito angustatum, ante medium sulcatum, lateribus longitrorum obtuse impressis; cerci longi, graciles, acuminati, superne longe pone medium dente obtuso armati; lamina subgenitalis longe producta, ultra medium sensim angustata et depresso, dein postice lateribus subparallelis instructa, apice truncata vel subsinuato-truncata; antennæ capite pronotoque unitis longiores; lobi metasternales contigui.

♀. Antennæ capite pronotoque unitis longitudine subæquales; lobi metasternales leviter distantes.

Patria: Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

Intervallum oculorum utriusque sexus costa frontali nonnihil latius.

3. *B. infirmus* STÅL. — *B. odontocero* simillimus, differt corpore nonnihil graciliore; capite proportionaliter crassiore; genis etiam pone partem inferiorem oculorum vitta obliqua abbreviata fusca notatis; elytris aliquæ abbreviatis, illis capite pronotoque unitis longitudine subæqualibus, pone medium sensim fortiter angustatis; venis radialibus elytrorum obscurius fuscis; antennis subtestaceis, haud

variegatis; lobis metasternalibus feminæ contiguis, femoribus anteriores apice macula nulla vel obsoletissima notatis, areu apicali laterali femorum posticorum deficiente, femoribusque posticis angustioribus. ♀. Long. 30 mill.

Patria: Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

Antennæ exempli descripti partim mutilæ.

aa. *Corpus magis elongatum; caput angustius; frons magis obliqua; fastigium verticis magis prominulum, minus obtusum; femora postica dente apicali dorsali longiore et acutiore, angulis apicalibus dorsalibus in dentem acutum productis lobisque genicularibus longioribus et fortius acuminatis instructa; elytra apicem femorum posticorum sat longe superantia; margo costalis apud feminas anterius fortius rotundato-ampliatus, costa ejusdem sexus quam apud mares anterius fortius elevata et a radio magis distans; vena ulnaris interior et vena analis ante medium elytri apud feminas dense pilosa: spina prosternalis gracillima; margines tibiarum posticarum fortius laminati; frons levigata, haud fusco-conspersa.*

4. *B. acutus* STÅL. — Flavo-virescens, nitidus; vitta postoculari genarum, per partem superiore laterum thoracis ducta, nec non venis radialibus et ulnari elytrorum nigricantibus; femoribus anticis apice extus macula obsoleta testacea; femoribus posticis extus vitta obscuriore destitutis, capitulo areu lateralí testaceo notato, lobis genicularibus anterius macula marginali obscuriore obsoleta instructis; tibiis posticis subtus nigro-vittatis; præcedentibus simillimus, sed longior, gracilior. ♂♀. Long. 31—35 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sensim obtuse sinuatum; lamina supraanalis parviseula, triangularis, utrinque leviter rotundata, apice acute producta; cerci mediocres, teretes, sensim acuminati; lamina subgenitalis in conum gracilem, acuminatum, spiniformem, sat longe producta; intervallum oculorum costæ frontali latitudine æquale; antennæ capite pronotoque unitis nonnihil longiores; lobi metasternales contigui.

♀. Antennæ capite pronotoque unitis paullo breviores; lobi metasternales nonnihil distantes.

Patria: Gayndah Australiæ. (Mus. Holm.) Cape York. (Coll. BRUNNER.)

HIEROGLYPHUS KRAUSS.

a. *Pronotum dorso anterius et posterius subadscendens, margine postico sensim obtuse rotundato; spina prosternalis minus gracilis; tibiae posticæ subtus vitta percurrente nigra instructæ, supernæ in apice haud nigrae, annulo subbasali nigra destitutæ; tarsi postici unicolores.*

1. *H. daganensis* KRAUSS.

aa. *Pronotum dorso nec anterius nec posterius adscendens, posterius angulum obtusum, apice rotundatum, formans; spina proster-*

nalis gracillima; tibiae posticæ subtus vitta nigra percurrente destitutæ, annulo subbasali apiceque lateris dorsalis nigris; articulus primus tarsorum posticorum basi niger.

2. *H. furcifer* SERV.

3. *H. tarsalis* STÅL. — Virescens; antennæ fuscis, basin versus interdum pallidis, articulis apice pallidis; sulcis tribus posterioribus pronoti fundo nigris; macula minutissima dorsali ipsius baseos femorum anteriorum, macula anteriore capituli femorum posticorum, annulo subbasali apiceque tibiarum posticarum, calcaribus tibiarum posticarum totis vel fere totis, nec non parte plus quam dimidia basali tarsorum posticorum nigris. ♂♀. Long. 41—62 mill.

♂. Margo apicalis segmenti dorsalis ultimi obtuse sinuatus, in medio leviter incisus, ad incisuram utrimque obtusissime rotundatus; lamina supraanalis primum sensim, apice subito fortius angustata, ante medium sulco instructa, marginibus ante medium latiuscula subreflexis; cerci mediocres, teretiusculi, sensim acuminati; lamina subgenitalis levissime prominula, obtuse subconica; lobi metasternales contigui; intervallum oculorum minus latum, oculis angustius; oculi medioeres, latiusculi.

♀. Lobi metasternales sat distantes; intervallum oculorum latum, oculis fere latius; oculi angustiores.

Patria: Silhet; China. (Coll. BRUNNER.)

H. furcifero maxime affinis, differt præsertim magnitudine maiore, intervallo oculorum lato, elytris in areis postradiali et interulnari vena intercalata destitutis, cercis inermibus, lamina subgenitali multo breviore, parte basali nigra articuli primi tarsorum posticorum longiore oculis, angustioribus, minus convexis. Antennæ exemplorum descriptorum partim mutilæ.

RACILIA STÅL.

1. *R. femoralis* STÅL. — Olivaceo-nigra vel subcæruleo-nigra; antennæ nigris, apice pallide flavescentibus; vitta laterali corporis, in fronte ad antennas incipiente, oculos sequente, per partem inferiorem genarum et laterum thoracis ducta, flava; vitta dorsali capititis, pronoti et abdominis, in feminis latissima, nec non area anali elytrorum viridi-testaceis vel glauco-virescentibus; alis infuscatis; pedibus anterioribus olivaceo-virescentibus; femoribus posticis rufo-testaceis, extus in disco interdum in olivaceum vergentibus; capitulo geniculari, tibiis tarsisque posticis obscure glaucis vel glauco-nigris. ♂♀. Long. 20—29 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum apice sinuatum et in medio lobulis duobus obtusis instructum; lamina supraanalis triangularis, ante medium sulcata, medio carina interrupta transversa instructa; cerci mediocres, teretes, sensim gracilescentes; lamina subgenitalis obtuse conica, levissime producta; antennæ capite pronotoque unitis multo longiores; fastigio capititis angustiore.

♀. Antennæ capite pronotoque unitis breviores; fastigio latiore.
Patria: Insulæ Philippinæ. (Mus. Holm.)

Caput in fronte lateribusque verticis minus dense obsoletiuseule punctatum. Fastigium apud feminam nonnihil longius quam latius et planum, apud marem duplo longius quam latius, leviter excavatum. Costa frontalis angusta, marginibus elevatis, parallelis. Intervallum oculorum costa frontali duplo latius. Pronotum capiti longitudine subæquale, in lobo postico subcarinatum; dense distinctissimeque punctatum; lobus posticus lobo antico dimidio brevior, basi obtuse rotundato-angulatus. Elytra et alæ medium abdominis attingentia, illa posterius leviter angustata, apice rotundata, margine costali anteriorius leviter ampliato. Femora postica apicem abdominis leviter superantia vel haud attingentia. Lobi metasternales utriusque sexus sutura recta et longa contigui. Antennæ minus graciles. Oculi utriusque sexus sat convexi.

PRAXILLA STÅL.

a. *Elytra latiora, viæ vel leviter distantia, utrimque leviter rotundata, venis longitudinalibus pluribus crassiusculis instructa; pronotum basi obtuse rotundatum; femora postica apicem abdominis longissime superantia; pronotum dorso planum vel planiusculum, a lobis lateralibus ruga subtili lavigata separatum.*

1. *P. laminata* STÅL. — Olivaceo-virescens, dorso fuscescente-testacea; vitta postoculari genarum, per partem superiorem laterum thoracis et segmentorum quinque anteriorum abdominis continuata, nigra; mesopleuris et metapleuris fere totis nigris, oblique flavescente-vittatis; femoribus posticis apicem versus subtestaceis. ♂. Long. 13 mill.

♂. Abdomen postice recurvum; segmentum dorsale ultimum apice late obtuseque emarginatum, inerme; lamina supraanalis brevis, obtusa, sensim angustata, apice rotundata, basi lamina erecta, alta, triangulari, apice rotundata, nigro-marginata, basi utrimque sinuata, armata, carinis duabus mediis nigris, antice abbreviatis, retrorsum convergentibus, et posterius utrimque carinula nigra instructa, marginibus lateralibus pone medium subreflexis et nigris; cerci longiusculi, fortiter compressi, foliacei, sensim angustati, leviter incurvi; lamina subgenitalis nonnihil producta, erecta, apice obtusa, rotundata; lobi metasternales levissime distantes, pone foveolas subito divergentes; oculi sat magni, modice convexi.

Patria: Australia, New South Wales. (Coll. BRUNNER.)

Platynymæ Giornæ statura et punctura similis, sed fastigio horizontali, nonnihil magis prominulo, fronte obliquiore, apice abdominis crassiore, recurvo, antennis longioribus, punctura capitis remotiore, costa frontali pone antennas distinctius angustata et ceteris divergens. Genæ apicem versus et frons remote distincte punctulata.

Costa frontalis fere a basi ultra medium obtuse excavata, pone antennas basin versus sensim distinete angustata. Carinae laterales frontis sensim sat divergentes. Pronotum dorso planiusculum, carina distincta percurrente instructum, marginibus lateralibus lœvigatis, subcallosis, a medio lobi antici antrorum subdivergentibus, retrorsum distinctius sensim divergentibus, instructum; in dorso ubique et sat dense fortiusculeque, in lobis lateralibus vix nisi antice et posterius punctatum; lobe anticus lobo postico vix duplo longior. Elytra leviter distantia, ovalia, nonnihil pone segmentum medianum extensa. Antennæ partim mutilæ in exemplo descripto, capiti pronotoque unitis longitudine saltem æquales.

2. *P. latipennis* STÅL. — Virescens, dorso testacea; vitta laterali corporis, longe ultra medium abdominis extensa, in lobis lateralibus pronoti antice posticeque angustata, nigra; femoribus posticis apicem versus subtestaceis, extus ad carinam superiorem disci vitta abbreviata infuscata notatis; metapleuris oblique flavescente-vittatis; forte femina præcedentis, a qua differt statura robustiore, antennis brevioribus, pronoto tantum longitudine æqualibus, dorso pronoti minus plano, marginibus lateralibus per totam longitudinem sat fortiter et sensim divergentibus instructo, elytris majoribus, latioribus, contiguis, apice subtruncatis, lobis metasternalibus nonnihil distinctius distantibus, oculis minoribus et leviter convексis. ♀. Long. 15 mill.

Patria: Lord Howes Island. (Coll. BRUNNER.)

aa. *Elytra angusta, lateralia, extus rotundata, margine interiore recto, venis duabus vel tribus longitudinalibus, una fortiore, instructa; pronotum basi emarginato-truncatum; femora postica apicem abdominis minus longe superantia; dorsum pronoti teres, a lobis lateralibus ruga nulla separatum.*

3. *P. geniculata* STÅL. — Dilute testaceo-grisea, subtus cum pedibus dilute olivaceo-virescens; vittis duabus genarum, inferiore obliqua et interdum fere omnino deficiente, superiore per lobos laterales pronoti continuata, limbo exteriore horum lobarum, mesopleuris et metapleuris, vitta laterali longe versus apicem dorsi pronoti extensa, lateribus capituli femorum posticorum cum lobis genicularibus, nec non basi tibiarum posticarum nigris; vitta genarum et lobarum pronoti, inter vittas nigras posita vitta obliqua mesopleurorum et metapleurorum pallide flavescentibus; elytris fuscis, intus pallidis. ♀. Long. 17—18 mill.

Patria: Australia borealis. (Coll. BRUNNER.)

Notis allatis, nec non fronte loboque postico prouoti subtilius, illa quoque densius, punctatis, costa frontali basi levissime angustata a præcedentibus divergens. Antennæ capiti loboque antice pronoti unitis longitudine æquales.

CERCINA STÅL.

1. *C. obtusa* STÅL. — Dilute olivacea, nitida, remotissime pilosa; vitta postoculari genarum et lborum lateralium pronoti obscuriore; tibiis posticis testaceis, spinis apice nigris. ♀. Long. 20 mill.

Patria: Ceylon. (Coll. BRUNNER.)

Statura et punctura fere specierum *Praxillæ*. Genæ apicem versus et frons minus dense, pronotum densius distinete punctata, punctura pronoti in lobo postico quam in lobo antico subtiliore et densiore, in disco lborum lateralium sat remota. Antennæ breves, crassiusculæ, pronoto nonnihil breviores, articulis brevibus. Costa frontalis obsolete obtusissimeque sulcata, lateribus parallelis, basi leviter angustata. Fastigium transversum, obtusissimum, subhorizontale. Intervallum oculorum fere latius quam in feminis generis præcedentis, costa frontali duplo latius. Oculi leviter convexi. Pronotum dorso teres, basi apiceque truncatum, carinæ loco linea kevinscula instructum, sulcis lobi antici in medio interruptis. Elytra angusta, lateralia, pone segmentum mediaum leviter extensa, fere plus duplo longiora quam latiora, extus quam intus fortius rotundata. Femora postica apicem abdominis vix superantia. Lobi metasternales levissime distantes.

SPATHOSTERNUM KRAUSS.

1. *S. venulosum* STÅL. — *S. nigro-tæniato* maxime affine, differt magnitudine minore; fronte, uti videtur, minus obliqua; marginibus lateralibus dorsi pronoti anguste lævigatis, rugæ subtilis et obtusæ instar subelevatis; elytris disco vitta abbreviata fusca, antice posticeque venulis albicantibus instructa, ornatis, ultra medium densius reticulatis, venis præsertim illis transversis, quæ inter venas radiales interiores in disco elytris positæ sunt, multo numerosioribus; vitta laterali nigricante capitib thoracisque nulla vel in vittam saturatius virescentem mutata; lobis mesosternalibus pone medium fortius divergentibus; tibiis posticis extus, præter spinam apicalem, spinis decem armatis, quod tamen forte variat. ♀. Long. 20 mill.

Patria: India orientalis. (Coll. BRUNNER.)

METAPA STÅL.

1. *M. natalensis* STÅL. — Lurida, in ferrugineum leviter vergens, supra remote, subtus densius pilosa; pronoto lineis longitudinalibus nonnullis infuscatis obsoletis interdum ornato, margine incrassato

exteriore loborum lateralium pallidiore; femoribus posticis in parte inferiore lateris interioris vitta nigra, superne lineolas similiter coloratas pectinatim positas emitte; tibiis posticis dilute testaceis, subtus in basi apiceque nigris. ♂♀. Long. 37—51 mill.

♂. Segmentum dorsale ultimum profunde sinuatum; lamina supraanalis longa, triangularis, apice fortius angustata, sulco percurrente retrorsum angustato, eujus margines elevati sunt, instructa; cerci mediocres, compressiusculi, sensim acuminati, apicem laminæ supraanalis haud attingentes; lamina subgenitalis longissima, lamina supraanalisi fere duplo longior, acuta, fortiter compressa; intervallum costæ et radii in medio elytri leviter ampliatum et venis transversis minus curvatis et minus obliquis instructum.

♂. Intervallum costæ et radii in medio elytri haud ampliatum, venis transversis, fortiter obliquis, sigmoideis, numerosioribus instructum; valvulae genitales margine inermes; lamina supraanalis sulcata.

Patria: Port Natal. (Coll. BRUNNER.)

Habitu puncturaque *Tropidopolæ fasciculatæ* sat similis, sed capite margis producto; fastigio capitis majore; temporibus posterius parti interjacenti fastigii latitudine subæqualibus, distincte punctatis; costa frontali basi fortius et per spatium longius compressa, apicem versus magis ampliata; elytris apicem femorum posticorum nonnihil superantibus (♂) vel vix attingentibus (♀); pedibus posticis apicem abdominis minus longe superantibus; femoribus posticis nonnihil angustioribus, et ceteris quæ ad notas genericas pertinent. Tibiæ posticæ extus spinis sedecim vel septemdecim armatae.

XENIPPA STÄL.

1. *X. viridula* STÄL. — Dilute virescens; supra remotissime, subtus densius pilosa; antennis dorsoque corporis in pallidissime testaceum vergentibus; spinis tibiarum posticarum apice nigris. ♀. Long. 50 mill.

♀. Lamina supraanalis obtuse sulcata; valvulae genitales margine ante medium obtuse crenulatae.

Patria: Chartum. (Coll. BRUNNER.)

Propter longitudinem capitinis *Mesopi* habitu subsimilis, corpore autem breviore, capite per totam longitudinem apicem versus sensim angustato, antennis brevioribus et angustioribus, pedibus posticis nonnihil longioribus et ceteris valde divergens. Caput pronoto circiter duplo longius, a supero visum per totam longitudinem sensim angustum, in fastigio fronteque minus profunde rugulosum, in genis verticeque subtiliter remoteque punctatum; fastigium dimidium longitudinis capitinis occupans, planum, apice rotundatum, carina distincta, in verticem inter oculos continuata, instructum; vertex a fastigio sulco obsoleto separatus, inter oculos sensim levissime delivis, utrimque sulco obsoletissimo, usque ad basin extenso, in-

structus. Costa frontalis in parte circiter tertia basali fortiter compressa, laminata et sulco destituta, hinc apicem versus sensim ampliata et marginata. Carinæ laterales tantum partem dimidiam apicalem frontis occupantes. Tempora longa, usque ad antennas extensa, subtiliter carinato-marginata. Oculi parte infraoculari genarum distincte nonnihil longiores, sat distantes. Antennæ ensiformes, triquetrae, extus compressæ, capite nonnihil longiores. Pronotum dorso teres, basi obtuse rotundatum; sat dense punctatum, in lobo postico longitudinaliter rugosum, carina media percurrente obtusa distincta instructum. Elytra et alæ fortiter abbreviata, illa pronoto nonnihil longiora, lanceolata. Pedes anteriores breves, postici apicem abdominis haud multo superantes. Tibiae posticæ extus spinis duodecim vel tredecim armatae.

CERVIDIA STÅL.

1. *C. lobipes* STÅL. — Cervina, nuda, in parte apicali ventris et tibiis posticis remote pilosa; elytris pellucidis; alis levissime subinfuscatis, olivaceo-venosis; vertice genisque pallescentibus, vittis obscurioribus notatis; femoribus posticis intus dilute flavescentibus, subolivaceo-vittatis, ad capitulum geniculare fasciola nigricante notatis; tibiis posticis intus corallinis, basi pallidis et macula parva nigra notatis, spinis omnibus apice. interioribus quoque intus per totam longitudinem, nigris; mesonoto, metanoto vittaue lata dorsali abdominis olivaceis. ♀. Long. 77 mill.

♀. Lamina supraanalis obtuse sulcata: valvulae genitales margine inermes, subintegræ, postice sinnato-acuminatæ.

Patria: Cape York Australiæ. (Mus. Holm et Coll. BRUNNER)

Statura fere *Xenippa viridulæ*, capite autem proportionaliter breviore. Caput pronoto multo longius, in vertice genisque parce subtiliterque, in fastigio fronteque densius et fortius punctatum. Fastigium fere plus quam dimidiam longitudinem capitidis occupans, antrorum sensim distincte angustatum, apice subito fortius angustatum et in angulum obtusum distinctum terminatum, anterius transversim leviter excavatum, carina subtili, vix nisi posterius distinguenda, instructum, basi sulco transverso subtili a vertice separatum. Tempora longa, teretiuscula, immarginata. Vertex et fastigium in eodem plano jacentia. Frons carinis lateralibus ab antennis usque ad apicem extensis, antennas versus subtilioribus; costa in parte fere plus quam quarta basali fortiter compressa et laminata, hinc apicem versus sensim ampliata et marginibus elevatis laevigatis instructa. Antennæ ensiformes, depressæ, apicem versus lineares et teretes, capite pronotoque unitis nonnihil longiores. Oculi mediocre. Intervallum oculorum latiusculum, oculis angustius. Pronotum rugoso-punctatum, in lobo postico densius et subtilius punctatum, dorso teres, carina obsoletiuscula percurrente instructum, basi sensim minus obtuse rotundatum, lobo antico quam lobo postico haud

multo longiore. Elytra alaeque longa, apicem abdominis sat longe superantes, illa remote reticulata, angusta, apice fortiter angustata, apice angustissima, rotundata. Pedes postici apicem abdominis superantes. Femora postica ad partem quartam apicalem abdominis extensa. Tibiae posticæ extus spinis novem vel decem armatae.

CARSULA STÅL.

1. *C. sulciceps* STÅL. — Subferrugineo-flavescens, subitus sat dense pilosa; antennis basin versus nigro-variegatis; alis sordide hyalinis; tibiis posticis glauco-virescentibus, spinis apice nigris. ♀. Long. 64 mill.

♀. Lamina supraanalis sat longa, acuminata, ultra medium sulaeata; cerci longi, laminam supraanalem superantes, compressi, recti, posterius leviter angustati, obtusi, parce pilosi; valvulae anales longæ, pilosæ, rectæ, inermes.

Patria: Insulæ Philippinæ. (Mus. Holm.)

Statura fere *Xenippa viridulæ*. Frons, fastigium, pronotum et pleura densissime fortinusculeque punctata, vertex et genæ minus dense punctatae. Caput lobo antico pronoti plus duplo longius; fastigium sensim angustatum, apice rotundatum, planum, carina destitutum, a vertice sulco profundo separatum, dimidium longitudinis capitidis efficiens. Tempora teretia, immarginata, haud discreta. Frons carinis lateralibus destituta, costa inter basin et ocellum tectiformiter fortiter elevata, in parte quarta apicali ante ocellum depressa, sensim ampliata, vix impressa, marginibus obtusis. Antennæ anguste ensiformes, depressæ, superne basin versus obtusissime subtectiformes, capite vix longiores. Oculi mediocres. Intervallum oculorum angustiusculum. Pronotum dorso teres, carinae loco linea obsoletissima læviuscula instructum, sulcis transversis distinctioribus quam in generibus reliquis hujus divisionis, posterioribus duobus sat distantibus; lobus anticus lobo postico duplo longior, hoc basi rotundato. Elytra et alæ nonnihil ultra medium abdominis extensa, apicem femorum posticorum attingentia, illa posterius leviter angustata, apice rotundata. Pedes postici apicem abdominis haud longe superantes. Tibiae posticæ extus spinis quattuordecim vel sedecim, intus spinis numerosioribus, apicem versus dense positis, armatae.